



Num. 577. Publicado el 18/04/2016

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Blanus cinereus*. Por José Rafael González López



Num. 577. Publicado el 18/04/2016

Descripciones de especies

Glaucium corniculatum (L.) Rudolph

Planta anual, vilosa, erecta, glauca, con tallos de 30-40 cm, ramosos. Hojas (6) 10-25 x 1,5-3 cm; las basales, pecioladas, con segmentos lobado-dentado...

Cultivos, barbechos y lugares alterados; 0-1000 m...

Región mediterránea, Canarias, Madeira, C y NE Europa, S de Rusia. C, W, S y E de la Península y Baleares. ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/glaucium-corniculatum.html>

Blanus cinereus (Vandelli, 1797)

La culebrilla ciega tiene una morfología similar a una lombriz de tierra debido a su cuerpo sin extremidades, anillado, y de color entre el rosa grisá...

Blanus cinereus está estrictamente adaptado a la vida subterránea, habiéndose especializado en cavar túneles y en la localización de presas bajo tierra...

Es un endemismo ibérico que se encuentra en la mayor parte de la Península, excepto en el norte y noreste (casi toda Galicia, Asturias, Cantabria, Paí...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/blanus-cinereus.html>

Arabis auriculata Lam.

Planta de 10-40 cm, unicaule, rara vez pluricaule. Tallos erectos, simples o ramificados generalmente en la mitad superior; densamente pubescentes, c...

Pastizales terofíticos montanos; generalmente calcícola; 500-2400 m...

C y S de Europa, O y CO de Asia, N de África. Gran parte de la Península, falta en Portugal...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/arabis-auriculata.html>

Allium triquetrum L.

Hierba perenne con un bulbo de 13-28 x 11-36 mm, de ovoide a globoso, solitario o gregarios, con 2 o 3 bulbillos de 9-13 x 5-8,6 mm, sésiles -situado...



Prados, claros de pinar, alcornocal o robledal, márgenes de arroyo, taludes o bordes de camino; 0-850(1200) m....

SO de Europa, NO de África, Canarias y Madeira; naturalizado en el N y S de América, Australia, Gran Bretaña, Turquía y posiblemente en las islas maca...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/allium-triquetrum.html>

Abralia veranyi (Rüppell, 1844)

Calamar con una longitud de manto máxima de 50 mm. El manto tiene forma cónica. Las aletas son muy anchas, llegando a suponer más de la mitad de la lo...

Se trata de una especie mesopelágica que vive entre los 20 y 800 metros de profundidad en las zonas de plataforma y pendiente continentales; más difíc...

Se distribuye por el Mar Mediterráneo y el Atlántico, alcanzando Madeira por el norte. En la costa occidental del Atlántico se distribuye desde el nor...

Por FERNÁNDEZ-ÁLVAREZ, Fernando Ángel

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/abralia-veranyi.html>

Novedades corológicas

Athelia bombacina (Link) Pers. (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Piloñeta, Piloña. ASTURIAS el día 11/04/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/athelia-bombacina-link-pers-1/24607.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Araucaria bidwillii Hook. (Pinophyta)

Blanus cinereus (Vandelli, 1797) (Chordata)

Glaucium corniculatum (L.) Rudolph (Magnoliophyta)

Hygrophorus marzuolus (Fr.) Bres. (Basidiomycota)

Norellisoma spinimanum Fallén, 1819 (Arthropoda)



Panaeolus fimicola (Pers.) Gillet (Basidiomycota)

Pteris vittata L. (Pteridophyta)

