



Num. 578. Publicado el 25/04/2016

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Sepia officinalis*. Por Ricardo R. Fdez



Num. 578. Publicado el 25/04/2016

Descripciones de especies

Veronica praecox All.

Hierba anual, a menudo de color rojizo-púrpura en diversas partes de la planta, con tallos de 2-24 cm, erectos, simples o ramificados desde la base, c...

Terrenos cultivados, taludes de borde de caminos, gleras y pastos de montaña; 0-2200(2500) m....

Europa, NW de África y SW de Asia. Ampliamente extendida por casi toda la Península Ibérica, aunque falta en las regiones más occidentales. ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/veronica-praecox.html>

Ulex parviflorus Pourr.

Planta sufruticosa o arbusto de hasta 2 m de altura, erecto, con ramificación cerrada y densa -con ramas todas semejantes-, o abierta y con largos ta...

Matorrales sobre calizas o dolomías, granitos y esquistos; 0-1900 m....

S de Francia, E y S de España...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ulex-parviflorus.html>

Pulsatilla rubra Delarbre

Planta vilosa con un rizoma craso, oblicuo, del que surge un tallo florífero de hasta 20-30 cm. Hojas basales no persistentes, al menos 2-pinnatisectas...

Planta acidófila que crece entre los 400 y 1500 m de altitud....

SO de Europa. Cuadrante NE peninsular....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pulsatilla-rubra.html>

Paronychia capitata subsp. capitata (L.) Lam.

Hierba perenne, laxamente cespitosa, con cepa leñosa. Tallos muy ramosos desde la base, postrados, a menudo densamente enmarañados; entrenudos 2-10 mm...

Pastos y matorrales secos, muy degradados, terrenos baldíos, etc., generalmente en substratos calizos o yesosos, pero también en rañas silíceas,



aren...

Región mediterránea. Gran parte de la Península Ibérica y Baleares, excepto en el W y en la zonacantábrica...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/paronychia-capitata-subsp-capitata.html>

Cynomorium coccineum L.

Planta perenne, con una raíz muy modificada, tuberiforme, de hasta 6(10) x 1,5-3 cm, rugosa, simple o más o menos ramificada, provista de numerosos ha...

Parasita la raíz de diversos géneros de Chenopodiaceae, como Suaeda, Atriplex, Halimione, Salsola, más Frankenia, Inula, Tamarix y otras especies haló...

Península Ibérica, Baleares, Italia, Córcega, Cerdeña, Sicilia, Malta, Canarias, N de África -desde Mauritania hasta el Sinaí, y en Somalia-, Israel, ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cynomorium-coccineum.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Ageratina adenophora (Spreng.) R.M.King & H.Rob. (Magnoliophyta)

Cololejeunea minutissima (Sm.) Schiffn. (Marchantiophyta)

Cortinarius impolitus Kauffman (Basidiomycota)

Cynomorium coccineum L. (Magnoliophyta)

Gnaphalium purpureum L. (Magnoliophyta)

Hebeloma collariatum Bruchet (Basidiomycota)

Helvella fusca Gillet ss. Bres. (Ascomycota)

Macoma balthica (Linnaeus, 1758) (Mollusca)

Paronychia capitata subsp. capitata (L.) Lam. (Magnoliophyta)

Pholiotina vestita (Fr.) Singer (Basidiomycota)



Psilocybe montana (Pers.) P. Kumm. (Basidiomycota)

Tellina fabula Gmelin, 1791 (Mollusca)

Ulex parviflorus Pourr. (Magnoliophyta)

Veronica praecox All. (Magnoliophyta)

