



## Num. 578. Publicado el 25/04/2016

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Sepia officinalis*. Por Ricardo R. Fdez



**Num. 578. Publicado el 25/04/2016**

## Descripciones de especies

### *Veronica praecox* All.

Hierba anual, a menudo de color rojizo-púrpura en diversas partes de la planta, con tallos de 2-24 cm, erectos, simples o ramificados desde la base, c...

Terrenos cultivados, taludes de borde de caminos, gleras y pastos de montaña; 0-2200(2500) m....

Europa, NW de África y SW de Asia. Ampliamente extendida por casi toda la Península Ibérica, aunque falta en las regiones más occidentales. ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/veronica-praecox.html>

### *Ulex parviflorus* Pourr.

Planta sufruticosa o arbusto de hasta 2 m de altura, erecto, con ramificación cerrada y densa -con ramas todas semejantes-, o abierta y con largos ta...

Matorrales sobre calizas o dolomías, granitos y esquistos; 0-1900 m....

S de Francia, E y S de España...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ulex-parviflorus.html>

### *Pulsatilla rubra* Delarbre

Planta vilosa con un rizoma craso, oblicuo, del que surge un tallo florífero de hasta 20-30 cm. Hojas basales no persistentes, al menos 2-pinnatisectas...

Planta acidófila que crece entre los 400 y 1500 m de altitud....

SO de Europa. Cuadrante NE peninsular....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pulsatilla-rubra.html>

### *Paronychia capitata subsp. capitata* (L.) Lam.

Hierba perenne, laxamente cespitosa, con cepa leñosa. Tallos muy ramosos desde la base, postrados, a menudo densamente enmarañados; entrenudos 2-10 mm...

Pastos y matorrales secos, muy degradados, terrenos baldíos, etc., generalmente en substratos calizos o yesosos, pero también en rañas silíceas,



aren...

Región mediterránea. Gran parte de la Península Ibérica y Baleares, excepto en el W y en la zonacantábrica...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/paronychia-capitata-subsp-capitata.html>

## *Cynomorium coccineum* L.

Planta perenne, con una raíz muy modificada, tuberiforme, de hasta 6(10) x 1,5-3 cm, rugosa, simple o más o menos ramificada, provista de numerosos ha...

Parasita la raíz de diversos géneros de Chenopodiaceae, como Suaeda, Atriplex, Halimione, Salsola, más Frankenia, Inula, Tamarix y otras especies haló...

Península Ibérica, Baleares, Italia, Córcega, Cerdeña, Sicilia, Malta, Canarias, N de África -desde Mauritania hasta el Sinaí, y en Somalia-, Israel, ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cynomorium-coccineum.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Ageratina adenophora* (Spreng.) R.M.King & H.Rob. (Magnoliophyta)

*Cololejeunea minutissima* (Sm.) Schiffn. (Marchantiophyta)

*Cortinarius impolitus* Kauffman (Basidiomycota)

*Cynomorium coccineum* L. (Magnoliophyta)

*Gnaphalium purpureum* L. (Magnoliophyta)

*Hebeloma collariatum* Bruchet (Basidiomycota)

*Helvella fusca* Gillet ss. Bres. (Ascomycota)

*Macoma balthica* (Linnaeus, 1758) (Mollusca)

*Paronychia capitata subsp. capitata* (L.) Lam. (Magnoliophyta)

*Pholiotina vestita* (Fr.) Singer (Basidiomycota)

ISSN 1887-5068



*Psilocybe montana* (Pers.) P. Kumm. (Basidiomycota)

*Tellina fabula* Gmelin, 1791 (Mollusca)

*Ulex parviflorus* Pourr. (Magnoliophyta)

*Veronica praecox* All. (Magnoliophyta)

