



Num. 579. Publicado el 02/05/2016

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Flabellina babai*. Por Marcos Fernández Iglesias



Num. 579. Publicado el 02/05/2016

Descripciones de especies

Ornithopus perpusillus L.

Hierba anual, erecta, decumbente o ascendente, con tallos 5-42 cm, laxamente vilosos. Hojas 1,2-6,7 cm, las inferiores pecioladas, las medias y superiores...

Pastos montañosos, en substrato calcáreo o silíceo; (200)800-1500(1700) m....

Oeste y centro de Europa. Frecuente en el N, C y W de la Península Ibérica, rara en el NE y no conocida del E y S de España (Andalucía)...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ornithopus-perpusillus.html>

Fagonia cretica L.

Planta herbácea anual de hasta 60-70 cm, postrada o trepadora, glabrescente, espinosa, con tallos angulosos y estriados, muy ramificados. Hojas de 8-25...

Crece en campos abandonados, laderas pedregosas y escombreras, lugares áridos, en suelos removidos, desde el nivel del mar a los 800 m de altitud....

Aparece en el S de la Región Mediterránea, Canarias y el Sahara. En la Península Ibérica en el E y S, desde Castellón hasta Cádiz, y Baleares, más rar...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/fagonia-cretica.html>

Erysimum repandum L.

Planta anual, de 15-35 cm en la fructificación; con pelos naviculares y 3-radiados. Tallos erguidos o ascendentes, con pelos naviculares. Hojas de (10)...

Mala hierba en campos abandonados, cultivos, caminos; normalmente en suelos arcillosos o margosos; 600-1400 m....

Europa, SW de Asia, N de África; introducida en el N y S de América y Australia. C, CE de la Península....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/erysimum-repandum.html>

Cochlearia glastifolia L.

Hierbas anuales, unicaules, con un tallo de (50)60-100(150) cm, erecto, fistuloso. Hojas caulinares inferiores con pecíolo alado y limbo elíptico, de



m...

Lugares húmedos, márgenes de arroyos y acequias; 600-800 m....

Península Ibérica y naturalizado en el S de Francia e Italia. ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cochlearia-glastifolia.html>

Ballota hirsuta Benth.

Planta sufruticosa de 24-60 cm, leñosa en la base, con tallos color castaño, con pelos simples de c. 1 mm, patentes, finos o lanosos, con pelos compue...

Matorrales en suelos pedregosos o roquedos, cauces secos de ramblas, también en bordes de camino y lugares incultos nitrificados, indiferente edáfica;...

Península Ibérica, Baleares y N de África. Mitad S y E de la Península Ibérica, Islas Baleares....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ballota-hirsuta.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Ancistroteuthis lichtensteinii (Férussac, 1835) (Mollusca)

Anthostomella tumulosa (Roberge ex Desm.) Sacc. (Ascomycota)

Caenocoris nerii (Germar, 1847) (Arthropoda)

Canthophorus dubius (Scopoli, 1763) (Arthropoda)

Cochlearia glastifolia L. (Magnoliophyta)

Coprinellus pallidissimus (Romagn.) P. Roux, Guy García & S. Roux (Basidiomycota)

Dipcadi serotinum subsp. serotinum (L.) Medik. (Magnoliophyta)

Erysimum repandum L. (Magnoliophyta)

Euryopicoris nitidus (Meyer-Dür 1843) (Arthropoda)

ISSN 1887-5068



Fagonia cretica L. (Magnoliophyta)

Lithodora fruticosa (L.) Griseb. (Magnoliophyta)

Microlophium carnosum (Buckton, 1876) (Arthropoda)

Neottiella aphanodictyon (Kobayasi) Dissing, Korf & Sivertsen (Ascomycota)

Sisymbrium runcinatum Lag. (Magnoliophyta)

Sparaxis bulbifera (L.) Ker Gawl (Magnoliophyta)

