



Num. 58. Publicado el 16/01/2006

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Boletus radicans*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 58. Publicado el 16/01/2006

Descripciones de especies

Squalus acanthias Linnaeus, 1758

Tiburón de cuerpo fusiforme, alargado, de unos 1.2 m de longitud las hembras y 90 cm los machos. En la cabeza un rostro agudo de extremo redondeado, c...

En fondos arenosos y fangosos, entre 5 y 900 m de profundidad, pudiendo en ocasiones entrar en estuarios. Especie voraz, que se alimenta de invertebra...

Desde Noruega a Mauritania y el Mediterráneo. También en Azores, Canarias y Madeira....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/squalus-acanthias.html>

Scomber scombus Linnaeus, 1758

Pez de cuerpo alargado, fusiforme y de sección casi redondeada al estar poco comprimido lateralmente, que mide unos 45 - 50 cm de longitud. Carece de ...

Pelágico, forma grandes bancos que nadan a gran velocidad. Vive entre la superficie y los 300 m de profundidad, acercándose a la costa para la reprodu...

Desde el Norte de Noruega a las Azores, Mediterráneo y Mar Negro....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/scomber-scombus.html>

Salpa democratica (Forsk., 1775)

Esta especie pertenece a un grupo de tunicados caracterizados por tener forma de barril gelatinosa y vivir libres en el agua, formando parte del planc...

En aguas superficiales formando parte del plancton....

Desde las Islas Británicas al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/salpa-democratica.html>

Oblada melanura (Linnaeus, 1758)

Pez de cuerpo ovalado, largo, de unos 30 cm de longitud. Cabeza de perfil recto, con boca pequeña y dirigida a la parte ventral; sus mandíbulas



están ...

En fondos rocosos hasta 30 m de profundidad, formando bancos y alimentándose principalmente de pequeños invertebrados. Hermafrodita, a veces proteránd...

Desde el Cantábrico a Angola y el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/oblada-melanura.html>

Haliclona cinerea (Grant, 1826)

Esponja de color que varía del grisáceo al púrpura oscura, polimorfa, desde finos parches incrustantes con unos pocos pequeños ósculos a masas que se ...

Entre los 10 y 30 m de profundidad generalmente en zonas moderadamente expuestas en zonas rocosas....

Desde las Islas Británicas al Oeste de África y el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/haliclona-cinerea.html>

Flabellina pedata (Montagu, 1815)

Nudibranquio de cuerpo estrecho, largo, que llega a medir 5 cm de longitud. Los tentáculos orales son igual de largos que los rinóforos, siendo estos ...

En el sublitoral, hasta 40 m de profundidad, en zonas ligeramente expuestas. Se alimenta de los hidrozoos Eudendrium rameum, Obelia geniculata, Sertul...

Desde el sur de Noruega al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/flabellina-pedata.html>

Bowerbankia imbricata (Adams, 1798)

Briozoo que forma colonias ramificadas o arbustivas, con estolones tan anchos como los zooides e irregularmente ramificados. Los zooides, no calcifica...

En el intermareal y aguas poco profundas, sobre algas como Fucus vesiculosus, Ascophyllum nodosum y Cystoseira. También puede encontrarse en aguas tur...

Desde el Mar del Norte al Mediterráneo....

Por asturnatura.com



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/bowerbankia-imbricada.html>

Botrylloides leachi (Savigny, 1816)

Ascidas que forman colonias planas, incrustantes y lobuladas, a veces almohadilladas y flexibles. Están formadas por 3 - 12 individuos de 0.2 cm de a...

En aguas poco profundas, fijado a rocas o algas, incluso a otros animales como ascidias y a estructuras artificiales....

Toda la costa europea....

Por [asturnatura.com](http://www.asturnatura.com)

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/botrylloides-leachi.html>

Berghia coerulescens (Laurillard, 1830)

Nudibranquio de cuerpo alargado y estrecho, de unos 3 cm de longitud. Los rinóforos son característicos, con forma de mazo, y están cubiertos de papil...

En fondos rocosos, entre algas y piedras, alimentándose de las anémonas *Aiptasia couchi*, *Sagartia* y del hidrozoo *Eudendrium ramosum*....

Mediterráneo y costa atlántica adyacente....

Por [asturnatura.com](http://www.asturnatura.com)

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/berghia-coerulescens.html>

Balistes carolinensis Gmelin, 1789

Pez de cuerpo alto, romboide u ovalado, comprimido lateralmente, cubierto por placas óseas. Boca pequeña y armada de agudos dientes, tras la cual está...

Entre los 10 y 100 m de profundidad, en zonas rocosas e incluso puertos. Solitarios generalmente, pero a veces se encuentran en parejas o formando peq...

Desde el Mar del Norte a Angola y el Mediterráneo....

Por [asturnatura.com](http://www.asturnatura.com)

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/balistes-carolinensis.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Brissopsis lyrifera (Echinodermata)



Lacuna pallidula (Mollusca)

Linum bienne Miller (Magnoliophyta)

Megatrema anglicum (Arthropoda)

Pagellus acarne (Risso, 1827) (Chordata)

