



Num. 580. Publicado el 09/05/2016

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Histioteuthis reversa*. Por Fernando Ángel Fernández Álvarez



Num. 580. Publicado el 09/05/2016

Descripciones de especies

Sisymbrium runcinatum Lag.

Hierba anual, generalmente pluricaule, glabra o pelosa, con tallos de (10)20-80(100) cm, erectos, ascendentes o casi postrados, de glabros o glabresce...

Arvense, ruderal, en yesos, rocas calizas, suelos silíceos, zonas alteradas del quejigar-encinar; 150-1500 m....

SO de Europa, N de África, Crimea, Asia occidental hasta el Cáucaso y el Irán, introducida en Australia. Casi toda la Península Ibérica, escasa en el...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sisymbrium-runcinatum.html>

Lithodora fruticosa (L.) Griseb.

Subarbusto de (20)40-80(100) cm con tallos erguidos, muy ramificados, las partes jóvenes setoso-hispidas, gris-blanquecinas, las viejas con la cortez...

Encinares y matorrales, en substrato básico; 40-2100 m. ...

SE de Francia, España y NO de África -Argelia y Marruecos-. Por casi toda la mitad E de la Península Ibérica, falta o muy rara en el O. ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lithodora-fruticosa.html>

Dipcadi serotinum subsp. serotinum (L.) Medik.

Planta herbácea perenne con un bulbo de (1)1,5-3 cm de diámetro, ovoide, rodeado de varias túnicas papiráceas, blanquecinas o pardas. Tallo (10)20-40(...

Pastos secos arenosos, matorrales degradados, pedregales, ribazos y repisas de roquedo, en todo tipo de substrato; 0-1900(2000) m....

SO de Europa y N de África. Casi toda la Península -salvo en el extremo NO- y Baleares. ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/dipcadi-serotinum-subsp-serotinum.html>

Arabis planisiliqua (Pers.) Rechb.

Planta de (30)40-80 cm, uní o pluricaule. Indumento formado por pelos ramificados, sésiles o subsésiles, la mayoría de ellos naviculares y estrellados...



En claros de matorrales basófilos, rara vez en fisuras de rocas cuarcíticas, en sotos, etc.; 150-1150 m. ...

SO de Europa. Disperso por casi toda la Península Ibérica, más raro en el O...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/arabis-planisiliqua.html>

Ancistroteuthis lichtensteinii (Férussac, 1835)

Este calamar puede alcanzar una longitud de manto de hasta 30 cm de longitud, alcanzando los machos la madurez sexual en torno a los 20 cm. El manto e...

Vive entre la superficie y los 1300 metros de profundidad, estando asociada a fondos arenosos y de grava durante primavera y verano. Se alimenta de cr...

Mediterráneo occidental. También citada en el Atlántico norte, pero podría tratarse de otra especie (ver en Especies similares)...

Por FERNÁNDEZ-ÁLVAREZ, Fernando Ángel

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ancistroteuthis-lichtensteinii.html>

Novedades corológicas

Leptosphaeria ogilviensis (Berk. & Broome) Ces. & De Not. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Pineda, Somiedo. ASTURIAS el día 08/05/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/leptosphaeria-ogilviensis-berk-broome-ces-de-not-1/24930.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Cucurbitaria elongata (Fr.) Grev. (Ascomycota)

Cydnus aterrimus (Forster, 1771) (Arthropoda)

Histioteuthis reversa (Verrill, 1880) (Mollusca)

Lacerta bilineata (Daudin, 1802) (Chordata)

Neottiella albocincta (Berk. & M.A. Curtis) Sacc. (Ascomycota)

Patapius spinosus (Rossi, 1790) (Arthropoda)



Peirates stridulus (Fabricius, 1787) (Arthropoda)

Zygopleurage zygospora (Speg.) Boedijn (Ascomycota)

