



Num. 582. Publicado el 23/05/2016

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Lixus cardui*. Por José Rafael González López



Num. 582. Publicado el 23/05/2016

Descripciones de especies

Pseudoprotella phasma Montagu, 1804

Crustáceo de hasta 25 mm de longitud los machos y 20 las hembras, con un aspecto característico que recuerda las mantis. La cabeza tiene una espina do...

Normalmente sublitoral, entre algas y grandes hidrozooos....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pseudoprotella-phasma.html>

Echinops sphaerocephalus L.

Hierba perenne, unicaule o multicaule, verdoso-blanquecina, espinosa, con pelos araneosos y pelos pluricelulares glandulíferos, marcadamente glandulos...

Taludes y bordes de camino, en substrato calizo o margoso, rara vez silíceo; (430)530-2224 m....

S y C de Europa, SW de Asia y C y S de Rusia; introducida en las Islas Británicas, el N de América y Australia. NE y E de España....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/echinops-sphaerocephalus.html>

Conocephalum conicum (Linnaeus) Lindb.

Hepática que forma talos de color verde oscuro, acintados, de 1-1.5 cm de ancho y que pueden superar los 10 cm de longitud, que por lo general forman ...

Crece en zonas húmedas, ricas en bases, especialmente en la orilla de arroyos de montaña....

Es una especie común en Europa, cada vez menos frecuente en el sur donde va quedando relegada a zonas montañosas....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/conocephalum-conicum.html>

Aseroe rubra Labill.

Hongo con una llamativa forma en forma de estrella rojiza, similar a *Clathrus archeri*. Presenta un carpóforo inicialmente cerrado y casi hipogeo, glob...

Crece en zonas de bosques lluviosos tropicales, subtropicales o templados cálidos....



Especie originaria de Australia, Tasmania, Nueva Zelanda, que se ha difundido por muchas zonas del planeta debido a la exportación de material de jard...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/aseroe-rubra.html>

Arenaria obtusiflora Kunze

Hierba anual, raramente bienal, de hasta 14(18) cm, con tallos erectos o ascendentes, generalmente coloreados de púrpura, con indumento de pelos eglan...

La subespecie típica aparece en en pedregales y pastos secos, cuando el substrato es calizo; 800-1200(1400) m., mientras que subespecie ciliaris en pa...

Endémica de la Península Ibérica...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/arenaria-obtusiflora.html>

Novedades corológicas

Arecophila serrulata (Ellis & G. Martin) K.D. Hyde (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Remoria, Llanera. ASTURIAS el día 18/05/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/arecophila-serrulata-ellis-g-martin-k-d-hyde-1/25050.html>

Roussoella donacicola (Speg.) Y.M. Ju (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Remoria, Llanera. ASTURIAS el día 20/05/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//25094.html>

Seynesia nobilis (Welw. & Curr.) Sacc. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Remoria, Llanera. ASTURIAS el día 18/05/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/seynesia-nobilis-welw-curr-sacc-1/25053.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Aphanus rolandri (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Aploneura lentisci (Passerini, 1856) (Arthropoda)



Arecophila serrulata (Ellis & G. Martin) K.D. Hyde (Ascomycota)

Arenaria obtusiflora Kunze (Magnoliophyta)

Dalmannia aculeata (Linnaeus, 1761) (Arthropoda)

Haplodrassus signifer (C. L. Koch, 1839) (Arthropoda)

Hippobosca equina Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

Hyperomyzus picridis (Börner, 1916) (Arthropoda)

Lixus cardui Olivier, 1807 (Arthropoda)

Otis tarda Linnaeus, 1758 (Chordata)

Pseudoprotella phasma Montagu, 1804 (Arthropoda)

Roussoella donacicola (Speg.) Y.M. Ju (Ascomycota)

Seynesia nobilis (Welw. & Curr.) Sacc. (Ascomycota)

