



Num. 584. Publicado el 06/06/2016

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Armeria pubigera*. Por Ignacio Fernández Villar



Num. 584. Publicado el 06/06/2016

Descripciones de especies

Porella platyphylla (L.) Pfeiff.

Hepática robusta, con un talo de 3-10 cm de longitud, con ramas de cerca de 2 mm de anchura, aplanadas en estado ligeramente e irregularmente conraid...

Vive en zonas relativamente secas pero sombreadas, en cortezas de árboles, rocas y muros, en zonas calizas y también volcánicas, a menudo acompañada d...

Zonas templadas holárticas. Es una de las hepáticas foliosas más comunes en la zona mediterránea...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/porella-platyphylla.html>

Limonium sinuatum (L.) Mill.

Planta perenne, pluricaule, pelosa, con pelos largos. Cepa 0,5-3 cm. Hojas de la roseta 40-150 x 8-30 mm, no o solo en parte marchitas en la antesis; ...

Roquedos y arenales costeros, estepas salinas, raramente en el interior; 0-700 m....

Toda la región mediterránea. S de la Península. ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/limonium-sinuatum.html>

Launaea arborescens Murb.

Planta arbustiva o mata espinosa, de 40-150 cm, con tallos erectos, profusamente ramificados, zigzagueantes, con ramas ahorquilladas, divaricadas, pun...

Forma parte de matorrales en terrenos áridos, pedregosos, arenosos y en suelos alterados de la franja litoral y sublitoral; también en echos de rambla...

Especie norteafricana, que alcanza las Islas Canarias y los territorios semiáridos del sureste de la Península Ibérica, donde se distribuye principalm...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/launaea-arborescens.html>

Lathyrus filiformis (Lam.) J. Gay

Hierba perenne, rizomatosa. Tallos de 19-50 cm, ascendentes, ramificados en la base, generalmente angulosos, ápteros. Hojas pecioladas, las



inferiores...

Sotobosques y claros de matorral, pastos y laderas pedregosas en zonas montanas, sobre suelos calizos o silíceos; 400-1800 m. ...

España, S de Francia, N de Italia y NW de África. N, Cy E de España. E...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lathyrus-filiformis.html>

Cynoglossum cheirifolium L.

Hierba (15)25-40(65) cm, bienal, de ordinario totalmente cubierta de tomentoblanquecino. Tallos simples o ramificados desde la base, hirsutos o tomentosos...

Ruderal de lugares abiertos, secos, ribazos, cunetas, repisas y pies de roquedo, etc.; 10-1500 m....

Oeste de la región mediterránea. Casi toda la Península Ibérica, más rara hacia el NW. ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cynoglossum-cheirifolium.html>

Novedades corológicas

Urceolella saxifragae Svrček (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Saliencia, Somiedo. ASTURIAS el día 02/06/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/urceolella-saxifragae-svrcek-1/25214.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Anaceratagallia venosa (Fourcroy, 1785) (Arthropoda)

Cynoglossum cheirifolium L. (Magnoliophyta)

Exobasidium camelliae Shirai (Basidiomycota)

Festuca rivas-martinezii Fuente & Ortúñez (Magnoliophyta)

Lathyrus filiformis (Lam.) J. Gay (Magnoliophyta)

Launaea arborescens Murb. (Magnoliophyta)



Limonium sinuatum (L.) Mill. (Magnoliophyta)

Urceolella saxifragae Svrček (Ascomycota)

