



## **Num. 585. Publicado el 13/06/2016**

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Crucianella maritima*. Por Ignacio Fernández Villar



**Num. 585. Publicado el 13/06/2016**

## Descripciones de especies

*Ustilago nuda* (C.N. Jensen) Rostr.

Ustilaginal que desarrolla sus soros en las espiguillas de gramíneas del género *Hordeum*, de color pardo verdoso, pulverulentos, que normalmente destru...

Se desarrolla sobre *Hordeum*, y de forma artificial sobre *Agropyron*....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ustilago-nuda.html>

*Leucobryum glaucum* (Hedw.) Ångstr.

Musgo que forma almohadillas de forma casi circular, de 10 a 20 cm de diámetro, con los caulidios estrechos, glaucos, de 3-15 cm de altura. Los filidi...

Vive en sustratos descalcificados, generalmente húmedos, especialmente en humus bruto en suelos de coníferas....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/leucobryum-glaucum.html>

*Heliotropium supinum* L.

Hierba hasta de 80(100) cm, anual, más o menos vilosa, más o menos verdosa, a veces cenicienta. Tallos generalmente decumbentes, con pelos largos y p...

Pastizales más o menos húmedos, a veces arvense, en substrato arenoso o arcilloso, más o menos salino y más o menos nitrificado; 0-680 m. ...

S de Europa, África, Canarias -Fuerteventura- y W de Asia. Presente en buena parte de la Península Ibérica, ausente en casi todo el tercio norte. ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/heliotropium-supinum.html>

*Frullania tamarisci* (L.) Dumort.

Al igual que *Frullania dilatata*, forma céspedes, pero de mayor tamaño y que pueden alcanzar los 5 cm de espesor, que cuando están secos tienen un aspe...

Vive en zonas con elevada humedad ambiental, generalmente sombreados, prefiriendo cortezas de árboles, rocas silíceas, sobre otros musgos, pero tambié...

Presente en el este de Asia, norte de América, en Europa está muy difundida si bien es más rara en la Región Mediterránea....



Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/frullania-tamarisci.html>

## *Convolvulus tricolor* L.

Hierba anual, pubescente, con indumento heterótrico, con pelos de 0,2-0,3(0,5) mm, adpresos, mezclados con otros más largos de 0,5-1,4(2) mm, patent...

Lindes de cultivo, barbechos, dehesas, márgenes de camino, cunetas y pastizales estacionales, preferentemente en suelos arcillosos; 30-520(700) m. (I...

Península Ibérica, S de Francia, Grecia, Yugoslavia, Turquía, N de África; adventicia en Córcega, Sicilia, Alemania, Israel, Jordania y región macaron...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/convolvulus-tricolor.html>

## **Novedades corológicas**

### *Acanthophiobolus helicosporus* (Berk. & Broome) J. Walker (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Saliencia, Somiedo. ASTURIAS el día 10/06/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/acanthophiobolus-helicosporus-berk-broome-j-walker/25301.html>

### *Dothidea berberidis* De Not. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Saliencia, Somiedo. ASTURIAS el día 07/06/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/dothidea-berberidis-de-not-1/25273.html>

### *Melanoleuca substrictipes* Kühner (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Saliencia, Somiedo. ASTURIAS el día 06/06/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//25258.html>

### *Pirottaea imbricata* Nannf. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en La Peral, Somiedo. ASTURIAS el día 12/06/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/pirottaea-imbricata-nannf-1/25322.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**



*Acanthophiobolus helicosporus* (Berk. & Broome) J. Walker (Ascomycota)

*Camponotus vagus* (Scopoli, 1763) (Arthropoda)

*Convolvulus tricolor* L. (Magnoliophyta)

*Dothidea berberidis* De Not. (Ascomycota)

*Frullania dilatata* (L.) Dumort. (Marchantiophyta)

*Heliotropium supinum* L. (Magnoliophyta)

*Leontodon farinosus* Merino & Pau (Magnoliophyta)

*Pirottaea imbricata* Nannf. (Ascomycota)

*Psacasta exanthematica* (Scopoli, 1763) (Arthropoda)

*Tolmerus cingulatus* (Fabricius, 1781) (Arthropoda)

*Ustilago nuda* (C.N. Jensen) Rostr. (Basidiomycota)

ISSN 1887-5068



9 771887506008