



Num. 587. Publicado el 27/06/2016

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Pawsonia saxicola*. Por Ricardo R. Fdez



Num. 587. Publicado el 27/06/2016

Descripciones de especies

Plagiochila asplenioides (L.) Dumort.

Hepática que forma céspedes altos que alcanzan incluso varios metros cuadrados de extensión, con caulidios de color verde, luego pardos, de hasta 1 cm...

Crece en lugares sombreados, en suelos frescos y ricos en nutrientes, humíferos, generalmente acompañada de *Thuidium tamariscinum* y *Eurhynchium striat...*

Es común en las zonas frescas de Eurasia, estando en zonas sureñas restringidas a zonas montañosas...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/plagiochila-asplenioides.html>

Felimare bilineata (Pruvot-Fol, 1953)

Nudibranquio de hasta 30 mm de longitud, con el manto esencialmente negro con marcas y líneas amarillas y zonas de color azul brillante. El borde del ...

Intermareal....

Atlántico norte, norte de África y el Mediterráneo...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/felimare-bilineata.html>

Colutea arborescens L.

Arbusto o árbol pequeño de 2-3(5) m, de corteza persistente; indumento formado por pelos de hasta 0,4-0,7 mm, adpresos, rara vez erecto-patentes en l...

Carrascales, quejigares y hayedos, sobre substrato calcáreo; 300-1150 m. ...

S y C de Europa. NE de España...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/colutea-arborescens.html>

Centaurea pullata L.

Hierba anual, o perenne y entonces con raíz axonomorfa engrosada, napiforme, o con raíces fasciculadas tuberizadas, inerme, verde, con pelos tectores...



Herbazales nitrófilos de bordes de camino y carretera, preferentemente en sustratos calcáreos; 0-1500 m. ...

SO de Europa -Portugal, España y Francia- y NW de África; naturalizada o adventicia en algunos países del S de Europa y el N de África. Mitad S de la ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/centaurea-pullata.html>

Aristolochia baetica L.

Planta trepadora provista de un rizoma globoso-fusifforme del que surgen tallos sufruticulosos, con ramillas débiles, a veces filiformes, angulosas. Hoj...

Matorrales, bosques, setos y espinares, a veces en zonas rocosas; piso basal....

Sur de la Península Ibérica y N de África. Andalucía, Levante y el Algarve. ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/aristolochia-baetica.html>

Novedades corológicas

Coprinopsis laanii (Kits van Wav.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo, in Redhead, Vilgalys, Moncalvo (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Hayedo de Valgrande, Lena. ASTURIAS el día 26/06/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/coprinopsis-laanii-kits-van-wav-redhead-vilgalys-moncalvo-1/25494.html>

Hemimycena mauretana (Maire) Singer (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Puente de Quinzanas, Pravia. ASTURIAS el día 22/06/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//25424.html>

Heterosphaeria alpestris (Fr.) Höhn. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Puerto de Pajares, Lena. ASTURIAS el día 26/06/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//25488.html>

Leptosphaeria bellynckii (Westend.) G. Winter (Ascomycota)

Nueva para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Puerto de Pajares, Lena. ASTURIAS el día 26/06/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/leptosphaeria-bellynckii-westend-g-winter-1/25486.html>



Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Arenicolides branchialis (Audouin & Milne Edwards, 1833) (Annelida)

Carduncellus monspelliensium All. (Magnoliophyta)

Cerithe gymnandra Gasp. (Magnoliophyta)

Colutea arborescens L. (Magnoliophyta)

Coprinopsis laanii (Kits van Wav.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo, in Redhead, Vilgalys, Moncalvo (Basidiomycota)

Cynara humilis L. (Magnoliophyta)

Delphinium nanum DC. (Magnoliophyta)

Emex spinosa (L.) Campd. (Magnoliophyta)

Flagelloscypha minutissima (Burt) Donk (Basidiomycota)

Gluvia dorsalis (Arthropoda)

Hemimycena mauretana (Maire) Singer (Basidiomycota)

Heterosphaeria alpestris (Fr.) Höhn. (Ascomycota)

Leptosphaeria bellynckii (Westend.) G. Winter (Ascomycota)

Retama monosperma (L.) Boiss. (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068

