



Num. 590. Publicado el 18/07/2016

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Vipera aspis*. Por José Rafael González López



Num. 590. Publicado el 18/07/2016

Descripciones de especies

Trifolium fragiferum L.

Hierba perenne, estolonífera, pelosa al menos en los pecíolos. Tallos hasta de 45 cm, decumbentes y enraizantes en los nudos, glabros o glabrescentes...

Herbazales, en sustrato nitrificado y a veces un poco salino, generalmente en bordes de cursos de agua; 0-1500 m....

Europa -por debajo de 55° N-, SW de Asia, NW de África y región macaronésica (Madeira y Canarias) y W de Asia. Casi toda la Península Ibérica y Balea...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/trifolium-fragiferum.html>

Lychnis alpina L.

Hierba cespitosa con tallos de 3,5-15(30) cm, delgados, glabros, simples. Hojas de la roseta basal (1)1,5-5 x 0,2-0,3 mm, de linear-espátuladas a line...

Bosques y pastos subalpinos y alpinos; generalmente en sustrato ácido; 1700-2800 m....

Norte de Europa, Alpes, Apeninos y Península Ibérica -en el NE de Canadá y Groenlandia. Pirineos, Cordillera Cantábrica, Gredos y Sierra de Béjar....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lychnis-alpina.html>

Cryphaea heteromalla (Hedw.) D. Mohr

Musgo pleurocárpico de color verde oscuro cuyos tallos primarios crecen adheridos al sustrato, densamente ramificados y los tallos secundarios, son er...

Crece en las cortezas de los árboles y arbustos, raramente en rocas, formando céspedes en lugares húmedos....

Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cryphaea-heteromalla.html>

Carduncellus monspelliensium All.

Hierba perenne, rizomatoso-estolonífera, con cepa leñosa, acaule o caulescente-uni o pluricaule-, espinosa, de un verde claro o intenso, verde-grisá...



Tomillares, matorrales abiertos, pastos secos, ribazos, linderos de bosque, pedregales, etc., generalmente en substratos calizos o margosos, a veces ...

SO de Europa: España, S de Francia e Italia. Ampliamente repartido por el E, C, CN y S de la Península, más raro en el W, así como en las Islas Balea...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/carduncellus-monspelliensium.html>

Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch

Planta anual, glabra o laxamente hispida, con una raíz axonomorfa y tallo de hasta 200(300) cm, ramificado desde cerca de la base. Hojas de hasta 30 c...

Ruderal y viaria, preferentemente en cunetas, bordes de arroyos, etc; 20-1400 m....

C y S de Europa y W de Asia, introducida en otras regiones del mundo. Dispersa por casi toda la Península...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/brassica-nigra.html>

Novedades corológicas

Belonium incurvatum Graddon (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en puerto de Pajares, Lena, Asturias. ASTURIAS el día 17/07/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/belonium-incurvatum-graddon-1/25718.html>

Chalazion helveticum Dissing (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en puerto de Leitiriegos, Cangas del Narcea. ASTURIAS el día 17/07/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/chalazion-helveticum-dissing-1/25721.html>

Inocybe assimilata Britzelm. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Las Llamargas, Quirós. ASTURIAS el día 14/07/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/inocybe-assimilata-britzelm-1/25686.html>

Plenodomus libanotidis (Fuckel) Gruyter, Aveskamp & Verkley (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Llamardal, Somiedo. ASTURIAS el día 11/07/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/plenodomus-libanotidis-fuckel-gruyter-aveskamp-verkley-1/25654.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com



Astragalus australis (L.) Lam. (Magnoliophyta)

Belonium incurvatum Graddon (Ascomycota)

Cacoecimorpha pronubana (Hubner, 1799) (Arthropoda)

Calamintha grandiflora (L.) Moench (Magnoliophyta)

Chalazion helveticum Dissing (Ascomycota)

Hysterostegiella juniperina (E. Müll.) Schmid-Heckel (Ascomycota)

Inocybe assimilata Britzelm. (Ascomycota)

Omphalina mutila (Fr.) P. D. Orton (Basidiomycota)

Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068

