



## Num. 598. Publicado el 12/09/2016

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Salsola kali*. Por Ignacio Fernández Villar



**Num. 598. Publicado el 12/09/2016**

## Descripciones de especies

### *Veronica fruticans* Jacq.

Planta sufrucosa con tallos de (5)10-15(30) cm, de ascendentes a erectos, con pelos tectorescortos, hasta de 0,2(0,4) mm, incurvados y adpresos, cuy...

Fisuras, repisas de rocas y pastos de montaña pedregosos y secos, indiferente al substrato; 1100-3200 m....

Ártico-alpina; Groenlandia, N de Europa, y montañas del C, S y E de Europa. Pirineos, Cordillera Cantábrica, N del Sistema Ibérico, y otras montañas d...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/veronica-fruticans.html>

### *Utricularia vulgaris* L.

Hierba perenne, acuática, sumergida y flotante, con tallos estoloníferos numerosos, muy divididos, con los segmentos lineares, glabros; entrenudos 8-...

Aguas estancadas; 800-1000 m....

Montes de León y Cornisa Cantábrica. ...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/utricularia-vulgaris.html>

### *Solanum villosum* Mill.

Hierba anual o perennizante, inermes, subglabra o vilosa, con pelos simples, glandulosos o eglandulosos. Tallos hasta de 60 cm, decumbentes o erectos,...

Terrenos removidos o alterados, ruderal; 0-1000 m....

C y S de Europa, N África, W Asia y Macaronesia. La mayor parte de España, Baleares y C de Portugal...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/solanum-villosum.html>

### *Nigella gallica* Jord.

Planta herbácea con un tallo de (15)25-40 cm, erecto, glauco y glabro, con ramas ascendentes. Hojas 2-pinnatisectas, con los lóbulos oblongo-lineares. F...



Baldíos, cultivos de cereal, rastrojeras. V-VII. ...

Sur y oeste de Francia, Península Ibérica. Dispersapor la mayor parte de la Península, Menorca....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/nigella-gallica.html>

## *Epilobium brachycarpum* C. Presl

Hierba anual con raíz axonomorfa. Tallos 30-150 cm, de 2-7 mm de diámetro,erectos, provistos de numerosos ramilletes axilares y profusamente ramific...

Lugares nitrificados abiertos: cunetas, taludes del ferrocarril; 600-800 m. ...

Oeste de Norteamérica(desde la Columbia Británica hasta California y Arizona), Argentina. Naturalizada en el Cy CW de la Península...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/epilobium-brachycarpum.html>

## **Novedades corológicas**

### *Lojkania melasperma* (Cooke) M.E. Barr (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Valbúcar, Villaviciosa. ASTURIAS el día 11/09/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/lojkania-melasperma-cooke-m-e-barr-1/26282.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Almana longipes* (Dufour, 1849) (Arthropoda)

*Calycina confluens* (Schwein.) Kuntze (Ascomycota)

*Carduncellus arborescens* (L.) Sweet (Magnoliophyta)

*Consolida pubescens* (DC.) Soó (Magnoliophyta)

*Cotinus coggygria* Scop. (Magnoliophyta)

*Epilobium brachycarpum* C. Presl (Magnoliophyta)

*Lojkania melasperma* (Cooke) M.E. Barr (Ascomycota)



*Marasmius minutus* Peck (Basidiomycota)

*Plantago nivalis* Boiss. (Magnoliophyta)

*Solanum villosum* Mill. (Magnoliophyta)

