



Num. 601. Publicado el 03/10/2016

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Sarcocornia fruticosa*. Por Ignacio Fernández Villar



Num. 601. Publicado el 03/10/2016

Descripciones de especies

Plantago nivalis Boiss.

Hierba perenne, de 2-6(9) cm, acaule. Hojas 10-60(90) x 5-12 mm, en roseta basal, de lanceoladas a oblongo-lanceoladas, mucronadas, de enteras a débil...

Pastos en suelos pedregosos y húmedos, pero no encharcados, de reacción ácida; (1800)2300-3200 m....

Endemismo de Sierra Nevada....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/plantago-nivalis.html>

Euphorbia segetalis L.

Planta anual, bienal o perenne, glabra o glabrescente, más o menos glauca. Tallos hastade 80(100) cm, erectos, simples o ramificados basalmente, a m...

Sitios ruderales, campos de cultivo, pastos pedregosos y roquedos de lugares marítimos; indiferenteal substrato; 0-1200(1400) m. ...

Europa, N de África (N de Marruecos) y Macaronesia, introducida en Australia, Madagascar y E de Norteamérica. En casi todas las provincias, más frec...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/euphorbia-segetalis.html>

Erysiphe depressa (Wallr.) Link

Micelio en tallos y hojas, anfigeno, efuso o irregularmente dispuesto en parches, de evanescente a subpersistente. Conidióforos erectos, con células b...

Parasita plantas de los géneros Arctium, Berkheya, Centaurea, Fransera, Onopordum. ...

Europa, Asia, África y Norteamérica....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/erysiphe-depressa.html>

Armatoplana celta Noreña, C., Rodríguez, J., Pérez, J., Almon, B

Platelminto de cuerpo extraordinariamente aplanado y bastante alargado, con márgenes laterales ondulados y el extremo anterior ensanchado y más bien r...



Aparece en aguas tranquilas de las rías reptando entre los mejillones y bálanos que crecían sobre pantalanos o muelles flotantes, a escasos decímetros...

Ría de Arosa y Ría de Vigo....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/armatoplana-celta.html>

Amphictene auricoma (O.F. Müller, 1776)

Poliqueto de hasta 40 mm de longitud, de cuerpo corto, cónico, con 17 segmentos setíferos, 3 de los cuales son torácicos y 14 abdominales. La membrana...

Vive en muchos tipos de sedimento, siendo más abundante en fondos mixtos con arena fina, hasta los 500 m de profundidad....

Aparece desde el Atlántico NE hasta el Golfo de Guinea, Mediterráneo, Canadá....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/amphictene-auricoma.html>

Novedades corológicas

Porotheleum fimbriatum (Pers.) Fr. (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Valle de Lago, Somiedo. ASTURIAS el día 30/09/2016

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/porotheleum-fimbriatum-pers-fr-1/26574.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Aeonium arboreum Webb & Berthel (Magnoliophyta)

Armatoplana celta Noreña, C., Rodríguez, J., Pérez, J., Almon, B (Platyhelminthes)

Bovista dermoxantha (Vittad.) De Toni (Basidiomycota)

Bryophila domestica (Hufnagel, 1766) (Arthropoda)

Cupressus lusitanica Mill. (Pinophyta)

Cyathea cooperi (F. Muell.) Domin (Pteridophyta)



Eleusine indica (L.) Gaertn. (Magnoliophyta)

Galerina mniophila (Lasch) Kühner (Basidiomycota)

Kleidocerys ericae (Horvath, 1908) (Arthropoda)

Nemoraea pellucida (Meigen, 1824) (Arthropoda)

Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Pezotettix giornae (Rossi, 1794) (Arthropoda)

Porothelium fimbriatum (Pers.) Fr. (Basidiomycota)

