



Num. 604. Publicado el 24/10/2016

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Dryopteris guanchica*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 604. Publicado el 24/10/2016

Descripciones de especies

Neophron percnopterus Linnaeus, 1758

El alimoche es un ave de tamaño medio o grande, con 55-65 cm de longitud y 148-171 cm de envergadura, de aspecto inconfundible. Los adultos presentan ...

Vive en una gran cantidad de hábitats, siempre que haya escarpes rocosos en el que pueda nidificar. Prefiere zonas quebradas y abruptas, con cantiles,...

El alimoche aparece en el sur de Europa, Oriente Medio, Asia central y meridional y a lo largo de extensas regiones de África. En España aparece bien ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/neophron-percnopterus.html>

Mycena filopes (Bull.) P. Kumm.

Macroscopía. Sombrero de 8-15 cm de diámetro, cónico cilíndrico de joven, luego cónico campanulado, con la superficie lisa, translúcida estriada casi ...

Crece en bosques de caducifolios y coníferas, en el humus, en ramas o madera enterrada, también entre musgos y hierbas durante el otoño; en ocasiones...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/mycena-filopes.html>

Dicranum scoparium Hedwig

Musgo que forma densos grupos, de color verde claro a verde oscuro, con tallos de 2-10 cm, tomentosos con rizoides de blancos a pardos. Hojas muy vari...

Es una especie que se encuentra en un amplio abanico de hábitats, desde lugares muy expuestos a otros muy protegidos. Habitual en el suelos ácidos de ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/dicranum-scoparium.html>

Carduus platypus subsp. platypus Lange

Hierba bienal, espinosa, verde, con pelos unicelulares araneosos y pelos pluricelulares uniseriados. Tallos hasta de 190 cm, simples o ramificados en...

Herbazales en el borde de caminos y arcenes, orlas de bosque y sotobosques, baldíos, etc., en suelos más o menos nitrificados en substratos preferent...



Centro, CO y NO de la Península Ibérica. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/carduus-platypus-subsp-platypus.html>

Brachymeria minuta (Linnaeus, 1767)

Chalcídido con un tamaño de 3 a 7 mm, de coloración general negra, con los ojos gris pizarra. Tégulas amarillas claras. Patas negras con marcas amaril...

Parasita dípteros de las familias Sarcophagidae, Tachinidae y Calliphoridae y lepidópteros de las familias Arctiidae, Gelechiidae, Hesperidae, Lasioc...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/brachymeria-minuta.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Aphis fabae Scopoli, 1763 (Arthropoda)

Astacilla damnoniensis (Stebbing, 1874) (Arthropoda)

Astragalus incanus subsp. nummularioides (Desf.) Maire (Magnoliophyta)

Brachymeria minuta (Linnaeus, 1767) (Arthropoda)

Carduus platypus subsp. platypus Lange (Magnoliophyta)

Cerceris arenaria (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Cerceris rybyensis (Linnaeus, 1771) (Arthropoda)

ISSN 1887-5068

