



Num. 617. Publicado el 23/01/2017

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: . Por Juan Luis Menéndez



Num. 617. Publicado el 23/01/2017

Descripciones de especies

Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw.

Musgo acrocárpica, autoico, delicado y de color verde o con tonalidades rojizas, amarillas o pardas, que forman céspedes muy extensos. Tiene capítulos...

Lugares húmedos, turberas o taludes ácidos donde rezuma el agua. ...

Ha sido citado en la mitad norte peninsular....

Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sphagnum-capillifolium.html>

Paspalum dilatatum Poir.

Planta herbácea de 40-180 cm, con hojas de 6-45 cm de longitud y 3-12 mm de anchura, con una membrana sin cilios. Inflorescencia formada por 3-5 racimo...

Zonas ruderales y de cultivos, en lugares húmedos, charcas, turberas, entre 300 y 700 metros de altitud....

Es endémica de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay. Se ha introducido en numerosas regiones del mundo. Naturalizada en la zona cantáb...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/paspalum-dilatatum.html>

Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp.

Pequeñas plantas erectas, poco ramificadas, verdes, de unos 15 mm de altura, con esporofitos terminales que pueden llegar a medir 20 mm de longitud. ...

Dicranella heteromalla vive en suelos minerales o alterados por el hombre como taludes cercanos a caminos....

Zonas templadas del Hemisferio Norte...

Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/dicranella-heteromalla.html>

Chrysotoxum bicinctum (Linnaeus, 1758)

Sírfido que puede alcanzar una longitud de 10-13 mm. Su cabeza es ancha y aplanada, con la cara de color amarillento; antenas oscuras y más largas qu...



Aparece en zonas herbosas en las cercanías de zonas de matorral y arbolado...

Aparece desde Escandinavia hasta el sur de la Península Ibérica y el Mediterráneo, hasta Turquía y Siberia central...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/chrysotoxum-bicinctum.html>

Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)

El bisbita arbóreo es un ave de unos 15 cm de longitud y 26 cm de envergadura. Su dorso es pardo, con estrías, y la parte ventral muy rayada, con el p...

En época de cría vive en campiñas del norte con pastos, matorrales y árboles dispersos, y también en bosques aclarados. Presente también en melojares,...

Nidificante en la mayor parte de Europa, excepto Irlanda, que ocupa también una extensa zona de Asia hasta el este del lago Baikal, y el norte de Anat...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/anthus-trivialis.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Cortinarius hinnuleus Fr. (Basidiomycota)

Cyrba algerina (Lucas, 1846) (Arthropoda)

Geopyxis foetida Velen. (Ascomycota)

Hebe x franciscana (Eastw.) Souster (Magnoliophyta)

Hohenbuehelia auriscalpium (Maire) Singer (Basidiomycota)

Juglanconis appendiculata Voglmayr & Jaklitsch (Ascomycota)

Leptopus marmoratus (Goeze, 1778) (Arthropoda)

Nemastoma bimaculatum (Fabricius, 1775) (Arthropoda)

Nemastoma hankiewiczii Kulczynski, 1909 (Arthropoda)

Nemastomella hankiewiczii (Kulczynski, 1909) (Arthropoda)



Octospora axillaris (Nees) M.M. Moser (Ascomycota)

Oryza sativa L. (Magnoliophyta)

Podarcis guadarramae (Boscá, 1916) (Chordata)

Podarcis liolepis (Boulenger, 1905) (Chordata)

Sarcoscypha macaronesica Baral & Korf (Ascomycota)

Scutellinia pennsylvanica (Seaver) Denison (Ascomycota)

