



Num. 619. Publicado el 06/02/2017

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Ichthyaetus audouinii*. Por César Fernández González.



Num. 619. Publicado el 06/02/2017

Descripciones de especies

Triodia sylvina (Linnaeus, 1761)

Mariposa con una envergadura alar de 26-40 mm en el macho y de 30-50 mm en las hembras. Sus antenas son de color marrón y lobuladas, con una longitud ...

Vive en jardines, bosques y zonas herbosas. Vuela de julio a septiembre. Sus larvas se alimentan de las raíces de varias plantas entre las que se pued...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/triodia-sylvina.html>

Ruta montana (L.) L.

Hierba hasta de 70 cm, perenne, leñosa en la base, de un verde azulado más o menos pálido o grisáceo. Hojas en general agrupadas en la base de las r...

Claros y orlas de quejigar, encinar, matorrales, pastos secos, pedregales, roquedos soleados, bordes de camino, taludes, cauces fluviales, indiferent...

Península Ibérica, Mallorca, S de Francia, N de Italia, S de la Península Balcánica, Anatolia y el Magreb. Gran parte de la Península, escasea en Bal...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ruta-montana.html>

Rhytidiadelphus squarrosus (Hedwig) Warnstorf

Musgo pleurocárpico, robusto, muy corriente, que puede llegar a alcanzar los 10 cm de longitud. Forma tapices almohadillados en taludes, en los suelos...

Es abundante en los prados húmedos, en taludes junto a bosques, y viviendo en comunidad con *Calliergonella cuspidata*, *Pseudoscleropodium purum*, *Hyloc...*

Circumboreal....

Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/rhytidiadelphus-squarrosus.html>

Pterostichus madidus (Fabricius, 1775)

Pterostichus (*Steropus*) *madidus* es un carábido con una longitud de 13 a 20 mm. Áptero; de coloración negro brillante, frecuentemente con fémures rojiz...



Vive bajo piedras, cortezas en zonas de pastos más o menos abiertos, bosques secos, plantaciones de coníferas y zonas arbustivas. Es común en jardines...

Aoarece en la zona templada de las Islas Británicas, Irlanda, Francia, el oeste de Alemania, Holanda y España...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pteroichthys-madidus.html>

Iberolacerta galani Arribas, Carranza y Odierna, 2006

Es una lagartija de talla grande (la longitud cabeza-cloaca en las hembras puede medir hasta 84,42 mm) y con las patas, tanto anteriores como poster...

Iberolacerta galani es una especie diurna, rupícola, que habita zonas supraforestales caracterizadas por un clima de alta montaña (pisos climáticos or...

Especie endémica de los Montes de León: Sierra Segundera, Sierra de la Cabrera, Sierra del Eje o de Peña Trevinca y Sierra del Teleno, en donde se la...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/iberolacerta-galani.html>

Novedades corológicas

Galerina graminea (Velen.) Kühner (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en Arnao, Castrillón. ASTURIAS el día 30/01/2017

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//27910.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Galerida theklae A. E. Brehm, 1857 (Chordata)

Heuchera sanguinea Engelm. (Magnoliophyta)

Ichthyætus audouinii (Payraudeau, 1826) (Chordata)

Passiflora caerulea L. (Magnoliophyta)

