



## Num. 625. Publicado el 20/03/2017

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Lolliguncula diomedea*. Por Fernando Ángel Fernández Álvarez



Num. 625. Publicado el 20/03/2017

## Descripciones de especies

### *Withania frutescens* (L.) Pauquy

Arbusto dioico o polígamo, pubescente al menos cuando joven. Tallos hasta 2 m, ramificados; los jóvenes de un pardo claro, pubescentes, con pelos ...

Matorrales, taludes, laderas, roquedos, pedregales y márgenes de camino, en suelos preferentemente básicos y nitrificados; (5)10-700 m....

Oeste de la región mediterránea -Península Ibérica, Islas Baleares, Marruecos y W de Argelia-. CW de Portugal, E y S de España e Islas Baleares....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/withania-frutescens.html>

### *Sisymbrium erysimoides* Desf.

Hierba anual, unicaule, verde o teñida de color violáceo, glabrescente. Tallo 15-70(80) cm, erecto, simple o más frecuentemente con ramas erecto-pate...

Ruderal, arvense; 0-1250 m....

SO de Europa, Macaronesia, N y E de África, SW de Asia, introducido en Australia. E de la Península Ibérica y Baleares...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sisymbrium-erysimoides.html>

### *Pellia neesiana* (Gottsche) Limpr.

Hepática talosa de color verde oliva o verde oscuro, en ocasiones con un nervio central muy marcado, de color rojizo o casi púrpura. Sus talos pueden ...

Higrófila con preferencia de suelos neutros o ácidos....

Circumboreal, frecuente en toda la Península Ibérica....

Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pellia-neesiana.html>

### *Erophaca baetica subsp. baetica* (L.) Boiss.

Hierbas de hasta 100 cm, cubiertas de pelos de hasta 1,5 mm, los de los tallos y hojas blancos, los de las inflorescencias a veces acompañados de otr...

Sotobosques de alcornoques, encinares y quejigales, matorrales y en herbazales subnitrofilos; 0-1000? m....

Península Ibérica y NW de África (Argelia y Marruecos). Mitad sur de la Península Ibérica....



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/erophaca-baetica-subsp-baetica.html>

## *Erodium chium* (L.) Willd.

Hierba de 10-50 cm, anual, caulescente; raíces finas, más o menos ramificadas. Tallos ascendentes, con pelos no glandulíferos retrorsos, algunas veces...

Arenales, saladares costeros nitrificados, campos de cultivo y bordes de camino en suelos arenosos preferentemente básicos; 0-1300 m....

Cuenca mediterránea -desde el E de la Península Ibérica hasta Grecia y Egipto- y Macaronesia -Canarias y Madeira-, naturalizada en el NW de Europa y e...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/erodium-chium.html>

## **Novedades corológicas**

### *Mycosphaerella hermione* (Sacc.) Lindau ex Ranoj. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en PERAL, LA (SOMIEDO), A la entrada del pueblo, Somiedo. ASTURIAS el día 19/03/2017

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/mycosphaerella-hermione-sacc-lindau-ex-ranoj/28343.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

### *Lachnellula gallica* (P. Karst. & Har.) Dennis (Ascomycota)

### *Lolliguncula diomedeeae* (Hoyle, 1904) (Mollusca)

### *Mycosphaerella hermione* (Sacc.) Lindau ex Ranoj. (Ascomycota)

### *Noctua pronuba* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

### *Rhamphoria separata* Munk (Ascomycota)

### *Sphagnum centrale* Arnell & C. E. O. Jensen (Bryophyta)

### *Squilla mantis* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

### *Tachypodoiulus niger* (Leach, 1814) (Arthropoda)

