



Num. 628. Publicado el 10/04/2017

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Reboulia hemisphaerica*. Por Marta González García



Num. 628. Publicado el 10/04/2017

Descripciones de especies

Lygeum spartum L.

Planta herbácea perenne, con cortos rizomas, escamosos. Tallos de 25-75 cm. Hojas de 10-30 x 1-1.5 cm, convolutas, coriáceas, de ápice atenuado y fili...

Taludes y rellanos margosos, arcillosos, yesíferos y algo salinos. Es una especie habitual de las estepas salinas y terrenos margosos. ...

Aparece en el SE y SO de Europa y el norte de África...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lygeum-spartum.html>

Lathyrus tingitanus L.

Hierba anual, a veces algo leñosa en la base, trepadora, glabra o glabrescente, con glándulas rojas dispersas. Tallos hasta de 180 cm, ramificados al...

Claros de matorrales y bosques, herbazales de taludes, caminos, bordes de ríos o pantanos, enzonas húmedas, sobre suelos ácidos (granitos, arenas, c...

Península Ibérica, S de Francia, Cerdeña, NW de África y Macaronesia (Azores, Canarias y Madeira), introducida en EE.UU. y México. NE y S de España, ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lathyrus-tingitanus.html>

Claytonia perfoliata Donn ex Willd.

Hierba anual, multicaule. Tallos de 8-30 cm, simples, estriados, a veces casialados, desnudos, con solo 2 hojas connatas en la base de la infloresce...

En lugares más bien secos y arenosos; 0-400 m....

Originaria del N de América, naturalizada en el C y W de Europa. En puntos aislados de la Península....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/claytonia-perfoliata.html>

Cistus crispus L.

Arbustillo 20-50(70) cm, denso, ramas procumbentes, aromático, de color verde intenso y corteza muy escamosa, pardo-rojiza y brillante; ramillas, con...

Matorrales y claros de alcornocal, en regiones de clima caluroso, preferentemente sobre suelos muy arcillosos, en especial en los rojos descalcificados...

Región mediterránea occidental, desde Portugal y Marruecos hasta Sicilia y Túnez -falta en las otras islas y el resto de Italia-. Abunda en el cuadro...



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cistus-crispus.html>

Cistus albidus L.

Arbusto 40-100(150) cm, erguido, albotomentoso, de corteza grisácea; ramillas con pelos estrellados y algunos pelos simples, estos últimos sobre todo...

Matorrales que corresponden a la etapa regresiva de los encinares y otros bosques mediterráneos, en regiones próximas al mar o zonas de clima seco, p...

Mediterráneo occidental, desde Portugal y Marruecos hasta el N y C de Italia y Argelia. Abunda en la mitad S de la Península Ibérica, valle del Ebro...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cistus-albidus.html>

Novedades corológicas

Cryptovalsa protracta (Pers.) De Not. (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en CANCIENES, Cerca de las vías del tren, Corvera de Asturias. ASTURIAS el día 06/04/2017

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/cryptovalsa-protracta-pers-de-not-1/28511.html>

Myrmaecium rubrum (Aptroot, Aa & Petrini) Jaklitsch & Voglmayr (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en CANCIENES, Alrededores de la vía del tren, Corvera de Asturias. ASTURIAS el día 07/04/2017

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/myrmaecium-rubrum-aptroot-aa-petrini-jaklitsch-voglmayr-1/28521.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Cryptovalsa protracta (Pers.) De Not. (Ascomycota)

Leptosphaeria acuta (Moug. & Nestl.) P. Karst. (Ascomycota)

Locustella naevia (Boddaert, 1783) (Chordata)

Myrmaecium rubrum (Aptroot, Aa & Petrini) Jaklitsch & Voglmayr (Ascomycota)

Pachymerium ferrugineum (C.L.Koch, 1835) (Arthropoda)



Tenthredo arcuata Forster, 1771 (Arthropoda)

Uromyces viciae-fabae var. *orobi* (Schumach.) Jorst. (Basidiomycota)

