



Num. 634. Publicado el 22/05/2017

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Mnium stellare*. Por Marta González García



Num. 634. Publicado el 22/05/2017

Descripciones de especies

Thanatophilus sinuatus (Fabricius, 1775)

Sílfido de cuerpo aplanado y ovalado, mostrando una coloración negra o marrón-negro, recubierto con una pilosidad corta. Tiene una longitud de 9 a 13,...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/thanatophilus-sinuatus.html>

Riccia crozalsii Levier

Plantas de color verde o verde azulado, cuyos talos son furcados, midiendo cada lóbulo del talo entre 0.5-1 mm de anchura. Esta especie no forma roset...

Primer colonizador, de tierra desnuda, en lugares sombríos....

Aparece en zonas de clima mediterráneo habiendo sido citada en multitud de países europeos....

Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/riccia-crozalsii.html>

Pontogenia chrysocoma (Baird, 1865)

Especie de gusano poliqueto afroditoideo, conocidos comunmente como gusanos escamosos, debido a que su dorso está recubierto de élitros, a modo de esc...

Presente desde la franja intermareal hasta el circalitoral, frecuenta los fondos duros y mixtos, sobre todo dotados de piedras y arena, aunque también...

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pontogenia-chrysocoma.html>

Euphorbia oxyphylla Boiss.

Planta perenne, rizomatosa, glabra, glauca. Rizoma grueso, hasta de 30 mm de diámetro. Tallos de 20-45 cm, herbáceos, lignificados en la base, erecto...

Taludes, claros de escobonales, jarales y robledales algo degradados, a menudo en berrocales ysuelos más o menos sueltos; silicícola; 300-1700 m....

Planta endémica del centro oeste de la Península Ibérica....



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/euphorbia-oxyphylla.html>

Antrodia xantha (Fr.) Ryvarden

Basidiocarpos anuales, resupinados, a menudo ampliamente efusos, de hasta 5 mm de grosor, o a modo de numerosos sombreros redondeados o abultamientos ...

Normalmente en coníferas, especialmente Pinus y Larix, menos frecuentemente en Abies y Picea. Ocasionalmente en angiospermas como Salix....

Circumglobal en la zona de coníferas....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/antrodia-xantha.html>

Novedades corológicas

Stamnaria personii (Moug.) Fuckel (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en SANTA MARIA DE SOMIEDO, Vega de Penouta, Somiedo. ASTURIAS el día 16/05/2017

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/stamnaria-personii-moug-fuckel-1/28882.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Chiton olivaceus Spengler, 1797 (Mollusca)

Haliclona mediterranea Griessinger, 1971 (Porifera)

Hypotarzetta insignis (Berthet & Rioussel) Donadini (Ascomycota)

Magnolia x loebneri P.Kache (Magnoliophyta)

Megoura viciae Buckton, 1876 (Arthropoda)

Pontogenia chrysocoma (Baird, 1865) (Annelida)

Stamnaria personii (Moug.) Fuckel (Ascomycota)

