



Num. 637. Publicado el 12/06/2017

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Linum alpinum*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 637. Publicado el 12/06/2017

Descripciones de especies

Philonotis calcarea (Bruch & Schimp.) Schimp.

Musgo acrocárpico de unos 4 cm de longitud, de color verde claro, cespitoso, con caulidios erectos, de color rojo vivo. Los filidios miden 2x1mm y t...

Prefiere suelos calcáreos de cunetas húmedas o rezumantes. ...

Circumboreal....

Por GONZÁLEZ GARCÍA, Marta

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/philonotis-calcarea.html>

Notocelia uddmanniana (Linnaeus, 1758)

Pequeña mariposa de 15-20 mm de envergadura, fácilmente reconocible por su mancha de color pardo chocolate que presenta al final de las alas anteriore...

Una especie común y ampliamente distribuida que vive en bosques y zonas arbustivas donde existe Rubus, de la que se alimenta. Aparecen adultos en juni...

Desde Europa occidental, en las zonas aledañas al Mediterráneo, al Cáucaso, Kazakhsan, Iran y China....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/notocelia-uddmanniana.html>

Hymenocarpos lotoides (L.) Vis.

Hierba erecta o ascendente, ramificada desde la base o en la mitad superior, rara vez simple. Tallos (3)12-30(40) cm, a menudo moteados de púrpura, c...

Pastizales más o menos ruderalizados, eriales, taludes, prefiere suelos silíceos y arenoso-pedregosos; 0-1000(1300) m....

Península Ibérica y N de África (Marruecos). Disperso por gran parte de la Península Ibérica, falta en el tercio N y cuadrante NE....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hymenocarpos-lotoides.html>

Ceriporia camaresiana (Bourdot & Galzin) Bondartsev & Singer

Basidiocarpos anuales, resupinados, blandos y frágiles, efusos, con la superficie poroide al principio blanca, luego de ocrácea a canela pálido, en oc...

Crece en la madera de numerosos caducifolios y también Picea....



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ceriporia-camaresiana.html>

Arceuthobium oxycedri (DC.) M. Bieb.

Planta hemiparásita de pequeño tamaño, de hasta 15 cm, formada por un tallo dividido en numerosos artejos cuadrangulares, los basales caulinares más l...

Parásita sobre diversas especies de *Juniperus*, como *Juniperus oxycedrus*, *Juniperus communis*, *Juniperus phoenicea*, más rara en *Juniperus sabina* y Juni...

Cuenca mediterránea (S de Europa, N de África, Oriente Medio) y W de Asia (hasta el Himalaya). Mitad oriental de la Península Ibérica y esporádica e...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/arceuthobium-oxycedri.html>

Novedades corológicas

Venturia saliciperda Nüesch (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en PERAL, LA (SOMIEDO), A la entrada del pueblo, Somiedo. ASTURIAS el día 10/06/2017

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos//29124.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Anomala dubia (Scopoli, 1763) (Arthropoda)

Armeria transmontana (Samp.) G.H.M. Lawr. (Magnoliophyta)

Graddonidiscus hispanicus Raitv. & R. Galán (Ascomycota)

Linospora capreae (DC.) Fuckel (Ascomycota)

Magnolia grandiflora L. (Magnoliophyta)

Ustilago bullata Berk. (Basidiomycota)

Venturia saliciperda Nüesch (Ascomycota)

