



Num. 641. Publicado el 10/07/2017

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Triglochin maritima*. Por Ignacio Fernández Villar



Num. 641. Publicado el 10/07/2017

Descripciones de especies

Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.

Hierba glabrescente o algo pelosa, con tallos de 2-35 cm. Hojas de 1-70 x 0,3-13 mm; las basales, pecioladas, indivisas y orbiculares o lirado-pinnatif...

Suelos arenosos o pedregosos, incluso los ricos en nitratos, en general descarbonatados, temporalmente algo húmedos; 0-1800 m....

Oeste, centro y puntos dispersos del S de Europa, Madeira, Asia Menor, introducida en el N de América y Australia. Casi toda la Península, más escasa...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/teesdalia-nudicaulis.html>

Linum alpinum Jacq.

Hierba 5-30(40) cm, perenne, de cepa leñosa, delgada, en general ramificada. Tallos no floríferos hasta de 8(20) cm, numerosos, subsacubitos, glabr...

Pastos, crestas pedregosas, grietas de lapiaz, repisas de roquedo, pedregales, claros de pinar, prados, en substrato calizo; (1270)1600-2300(2500) m....

Montañas del S de Europa -desde el N de la Península Ibérica, hasta Bulgaria y el NE de Grecia-. Pirineos, raro en la Cordillera Cantábrica -valled...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/linum-alpinum.html>

Helianthemum apenninum subsp. *cantabricum* (M. Laínz) G. López

Planta de 5-30 cm, verde-cenicienta o blanquecina. Tallos de estrellado-pubescentes a incano-tomentosos, con pelos generalmente finos, sedosos, más o ...

Matorrales y lugares más o menos despejados, preferentemente en substrato calizo o margoso; 350-2000 m....

Cordillera Cantábrica y alrededores....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/helianthemum-apenninum-subsp-cantabricum.html>

Genista carpetana Lange

Sufrutice 0,13-0,4 m, erecto o decumbente y enraizante en los nudos, a veces poco leñoso, con ramas divergentes y espinosas. Tallos terminados en una...

Pastos de alta montaña y turbosos, en substrato granítico o esquistoso, rara vez en matorrales montañosos con substrato calcáreo; 1300-2050 m....



Península Ibérica y N de Marruecos(Rif). NO y C de España....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/genista-carpetana.html>

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.

Basidioma dimidiado de unos 15 cm de longitud, aplanado, perenne y sin estípites. La superficie superior del píleo es de color marrón grisáceo, muchas ...

Saprobio de árboles muertos y tocones, rara vez parásito. ...

Circumboreal. Es una especie muy común en el Norte de Europa, en Noruega, Suecia y Finlandia, pero se desconoce el límite sur exacto de su distribución...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ganoderma-applanatum.html>

Novidades corológicas

Bovista capensis (Fr.) J.C. Coetsee & A.E. van Wyk (Basidiomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en GIJON, Jardín Botánico Atlántico, Gijón. ASTURIAS el día 06/07/2017

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/bovista-capensis-fr-j-c-coetsee-a-e-van-wyk-1/29430.html>

Cucurbitaria rhamni (Nees) Fuckel (Ascomycota)

Primera cita provincial - Citado por Enrique Rubio Domínguez en SALIENCIA, La Farrapona, Somiedo. ASTURIAS el día 09/07/2017

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/cucurbitaria-rhamni-nees-fuckel-1/29466.html>

Daruvedia bacillata (Cooke) Dennis (Ascomycota)

Nuevo para Asturias - Citado por Enrique Rubio Domínguez en PINEDA, cruce a Pineda, Somiedo. ASTURIAS el día 03/07/2017

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/setas-hongos/daruvedia-bacillata-cooke-dennis-1/29399.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Anax ephippiger (Burmeister, 1839) (Arthropoda)

Bovista capensis (Fr.) J.C. Coetsee & A.E. van Wyk (Basidiomycota)

Cucurbitaria rhamni (Nees) Fuckel (Ascomycota)



Formica rufa Linnaeus, 1761 (Arthropoda)

Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) (Arthropoda)

Leptospermum scoparium .R.Forst. & G.Forst. (Magnoliophyta)

Lytta vesicatoria Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

Malus x purpurea (Eug. Barbier) Rehder (Magnoliophyta)

Myopa dorsalis Fabricius, 1794 (Arthropoda)

Serranus scriba (Linnaeus, 1758) (Chordata)

ISSN 1887-5068



9 771887506008