




## Num. 643. Publicado el 24/07/2017

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Circaea lutetiana*. Por Ignacio Fernández Villar



**Num. 643. Publicado el 24/07/2017**

## Descripciones de especies

### *Thlaspi arvense* L.

Planta anual, glabra, uni o pluricaule. Tallos erectos (9)20-50(60) cm, simpleso escasamente ramificados. Hojas inferiores de oblanceoladas a obovada...

Cultivos, bordes de camino, lugares alterados en general, más o menos húmedos o elevados; (15)700-2400m. ...

Eurasia, región mediterránea; introducida en el N de América, Australia, NuevaZelanda. C y E de la Península Ibérica, más rara en la mitad oeste....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/thlaspi-arvense.html>

### *Lupinus micranthus* Guss.

Planta de hasta 50 cm, herbácea, anual, hirsuta, con los pelos de 1 mm o más. Tallo generalmente muy ramificado desde la base. Hojas con 5-9 folíolos;...

Matorrales degradados, cultivos abandonados, cunetas, bordes de caminos, etc., en suelos ácido descarbonatados, bien drenados [pH 5,4-7,5, textura...

Cuenca mediterránea. C y SW de España, Menorca, C y S de Portugal....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lupinus-micranthus.html>

### *Juncus ranarius* Songeon & E.P. Perrier

Hierba anual, de 1-18 cm, multicaule. Tallos 10-105 x c. 0,6 mm, generalmentefasciculados, erectos o ascendentes. Hojas basales 1-3, las caulinares 1...

Pastos halófilos, cerca del mar o al borde de lagunas salobres; 0-1000 m. III-IX. ...

Hemisferio norte. Litoral de la Península y algunas lagunas del interior más Baleares....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/juncus-ranarius.html>

### *Gymnosporangium confusum* Plowr.

Hongo de tipo roya cuyo ciclo vital atraviesa por las siguientes fases: Picnidios globoso conoideos de unas 100 &micro;m de diámetro y algo más de alto,...

Los picnidios y ecios crecen sobre hojas de *Cotoneaste vulgaris*, *Crataegos laciniata*, *Crataegus monogyna*, *Crataegus oxyacantha*, *Mespilus germanica* mie...



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/gymnosporangium-confusum.html>

## *Eriophorum latifolium* Hoppe

Planta perenne, más o menos cespitosa, sin rizoma de entrenudos largos; raíces finas de 2-8(15) cm. Tallos 20-60(90) cm, obtusamente trígono. Hojas ...

Fuentes, suelos higroturbosos o muy húmedos, principalmente en áreas de montaña, indiferenteal substrato; 600-2400 m...

Europa, Asia y Norteamérica. N de España, Sistemas Ibérico y Central...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/eriophorum-latifolium.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Gymnosporangium confusum* Plowr. (Basidiomycota)

*Hydropisphaera erubescens* (Roberge ex Desm.) Rossman & Samuels (Ascomycota)

*Lachnum tenuipilosum* Svr&#269;ek (Ascomycota)

*Xerula radicata* (Relhan) Dörfelt (Basidiomycota)

