



Num. 647. Publicado el 21/08/2017

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Verbascum thapsus*. Por Ignacio Fernández Villar



Num. 647. Publicado el 21/08/2017

Descripciones de especies

Lactuca saligna L.

Planta herbácea anual, raramente bienal, de 10-65 cm. Tallos erectos o ascendentes, sulcados, blanquecinos, glabros o hispídos en la parte inferior, n...

Lugares con suelo alterado, como cascajeras fluviales, barbechos, campos incultos, soporta cierto grado de encharcamiento y salinidad, y puede abundar...

Por casi toda Europa, salvo en los países del extremo N. En España es rara en el cuadrante NW, pero resulta frecuente en el E y S. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lactuca-saligna.html>

Lactuca perennis L.

Planta perenne, de hasta 80 cm, con una raíz cilíndrica de la cual surge un tallo erecto y glabro. Hojas basales pecioladas, en roseta, las caulinares ...

Peñascales, graveras, pastos pedregosos, y también cascajeras fluviales y cunetas pedregosas desde los 500 a los 1900 m....

Endemismo del C y SW de Europa, desde España hasta el SW de Bulgaria. En España se encuentra sobre todo por la mitad N....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lactuca-perennis.html>

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.

Planta perenne, que despidе un olor desagradable al ser estrujada en fresco. Raíces gemíferas. Tallos 50-100 cm, lignificados en la base, foliosos, e...

Ruderal, con menor frecuencia viaria o arvense; 0-800 m. ...

Europa, N de África, W de Asia, América y Oceanía. Dispersa y poco frecuente en el C y N de la Península y Baleares, rara en Portugal....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/diplotaxis-tenuifolia.html>

Diplotaxis muralis (L.) DC.

Planta anual, a veces bienal o perennizante, que despidе un olor desagradable al ser estrujada en fresco. Raíz axonomorfa. Tallos 20-50 cm, más o men...

Arvense, viaria, ruderal, en substratos diversos; 0-1300 m....

Nativa en el C y S de Europa, introducida en el resto de Europa, N y S de América, Oceanía y S de África. Poco frecuente en el C y N de la Península y...



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/diplotaxis-muralis.html>

Diplotaxis erucooides (L.) DC.

Planta anual, inodora. Raíz axonomorfa. Tallos 20-80 cm, foliosos, más o menos erectos, con pelos retrorsos, más o menos adpresos, cortos, densos. Hoj...

Ruderal, viaria y arvense, frecuente en viñedos y rastrojos, en diversos substratos; 0-1500 m....

Región mediterránea, C de Europa y W de Asia. Frecuente en la mayor parte de la Península-excepto el cuadrante NW y Pirineos- y Baleares; rara en Po...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/diplotaxis-erucooides.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill (Basidiomycota)

Immersiella caudata (Sacc.) A.N. Mill. & Huhndorf (Ascomycota)

Mantispa styriaca (Poda, 1761) (Arthropoda)

Scutellinia olivascens (Cooke) Kuntze (Ascomycota)

