



Num. 648. Publicado el 28/08/2017

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Myosotis decumbens* subsp. *teresiana*. Por César Fernández González



Num. 648. Publicado el 28/08/2017

Descripciones de especies

Myosotis decumbens subsp. teresiana (Sennen) Grau

Hierba hasta de 50(70) cm, perenne, rizomatosa. Tallos simples o escasamenteramificados, en la mitad inferior con pelos largos y patentes, en la sup...

Pastizales en suelo higroturboso y humedales en suelo profundo, en hayedos, abedulares, abetales, pinares, rebollares y otras formaciones arbóreas, a...

S de Francia, España. Áreas montañosas del N, C y S de España. Esp.: Ab Al Av B Bu Ge Gr Hu J L Le Lo MNa O P S Te Za...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/myosotis-decumbens-subsp-teresiana.html>

Gagea soleirolii F.W. Schultz

Hierba perenne, de pequeño porte o relativamente elevada, grácil, por lo general glabra -excepto las hojas y muy raramente los pedicelos-, frecuentem...

Pastos de montaña, piornales, grietas o repisas de roca, escarpes pedregosos, rellanos y bases deroquedo, brezales o matorrales aclarados, linderos ...

Córcega, Cerdeña, Península Ibérica, Pirineos. Repartida por las montañas del N, C y CW de la Península -Pirineos centrales y orientales, Cordillera...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/gagea-soleirolii.html>

Gagea reverchonii Degen

Hierba perenne, grácil, predominantemente glabra, de un verde más o menos vivo, frecuentementeglaucoscente o glauca, teñida a menudo de pardo-rojizo...

Pastos frescos o húmedos, linderos y claros de bosque -pinares, sabinars de sabina albar, abedulares, hayedos, avellanars, encinares, etc.-, formaci...

Península Ibérica, Pirineos franceses y españoles, y Alpes Marítimos. Montañas del N, C, E y S de la Península, desde los Pirineos y Cordillera Cant...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/gagea-reverchonii.html>

Gagea liotardii (Sternb.) Schult. & Schult. fil.

Hierba perenne, relativamente robusta, pelosa en la inflorescencia o glabrescente, de un verde ± vivo, a veces teñida de color púrpura, con parte sub...



Prados húmedos o encharcados, borreguiles, cervunales, pastos de diente frescos o húmedos, repisashúmedas de roca, bordes de arroyo y laguna, pinare...

Montañas del C y S de Europa, Rusia, Córcega, Sicilia, NW de África -Atlas-, y SW, Cy E de Asia -Siberia, China, Pamir-Alai, W de Tien Shan, Kazajis...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/gagea-liotardii.html>

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.

Hierba perenne, que rebrota a partir de yemas axilares -en las hojas basales-que desarrollan una raíz axonomorfa y forman una planta independiente c...

Herbazales, claros y orlas de bosque, y lugares nitrificados más o menos húmedos; 0-1900 m....

Europa (más rara hacia el S), Asia templada y N de África. Principalmente en la mitad N de la Península....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/anthriscus-sylvestris.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Hieracium nobile Gren. & Godr. (Magnoliophyta)

Kontikia ventrolineata (Dendy 1892) (Platyhelminthes)

Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Perenniporia ochroleuca (Berk.) Ryvarden (Basidiomycota)

Phellinus torulosus (Pers.) Bourdot & Galzin (Basidiomycota)

