



Num. 650. Publicado el 11/09/2017

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: . Por Juan Luis Menéndez



Num. 650. Publicado el 11/09/2017

Descripciones de especies

Euphorbia platyphyllos L.

Planta anual, glabra o glabrescente, por excepción muy pelosa. Tallos de(20)30-80(100) cm, erectos, de ordinario afilos en el tercio inferior, no ra...

Herbazales de cunetas húmedas, márgenes de cultivos, ramblas pedregosas; 0-700(1000) m....

Ampliamente difundida por Europa, más rara en el N de África (Argelia). Introducida en Norteamérica, Sudamérica, Sudáfrica y Oceanía. N y NE de la Pe...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/euphorbia-platyphyllos.html>

Euphorbia falcata L.

Planta anual, glabra. Tallos de (2)5-25(40) cm, erectos o procumbentes, raramente postrados, simples o muy ramificados. Hojas 2-25(40) x 2-10(16) mm,...

Campos de labor, márgenes de caminos, yermos, pastos terofíticos efímeros y claros de matorral; prefiere los suelos calizos y débilmente nitrogenados...

S y C de Europa, N de África, W y C de Asia hasta la India y Pakistán, introducida en Norteamérica. Difundida por casi toda la Península y Baleares....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/euphorbia-falcata.html>

Chenopodium multifidum L.

Perenne, procumbente, aromática, pubescente, muy ramificada, especialmente cerca de la base. Ramas de hasta 1 m. Hojas cortamente pecioladas; lámina d...

Cunetas, zonas húmedas, costas y lugares ruderalizados, a menudo sobre gravas o arenas, costas; 0-500 m. ...

Originaria del S de América, naturalizada en la región mediterránea y S de Europa. Dispersa por gran parte de la Península...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/chenopodium-multifidum.html>

Centaureum tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch ex Janch.

Hierba anual, erecta, unicaule, glabra, con roseta basal poco desarrollada. Tallo 10-40(55) cm, erecto, tetragono, glabro, con costillas ligeramente ...

Pastizales temporalmente húmedos, depresiones, taludes y bordes de cultivo, en substratos preferentemente básicos, a veces salobres, así como en aren...



Región mediterránea y W de Europa; introducida en América del Norte y Australia. Casi toda la Península Ibérica y Baleares...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/centaurium-tenuiflorum.html>

Campanula erinus L.

Planta anual, hasta de 35 cm. Raíz vertical, corta. Tallo erecto o ascendente, simple o ramificado de manera más o menos dicotómica, hispido. Hojas ba...

Pastizales terofíticos, roquedos, muros; 0-1680 m. III-VIII. Circummediterránea....

Dispersa portada la Península e Islas Baleares. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/campanula-erinus.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Adalia decempunctata (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Centaurium tenuiflorum (Hoffmanns. & Link) Fritsch ex Janch. (Magnoliophyta)

Corvus monedula (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Helianthus tuberosus L. (Magnoliophyta)

Rabdophaga rosaria (Loew, 1850) (Arthropoda)

Talpa occidentalis Cabrera, 1907 (Chordata)

ISSN 1887-5068

