



Num. 653. Publicado el 02/10/2017

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Lychmis coronaria*. Por César Fernández González



Num. 653. Publicado el 02/10/2017

Descripciones de especies

Lychnis coronaria (L.) Desr.

Hierba robusta, blanco-lanosa. Tallos (25)30-100 cm. Hojas de la roseta basal 40-150 x 10-50 mm, oblongo-espátuladas, agudas o subobtusas; las caulina...

Cultivada como ornamental, naturalizada en algunas localidades; 100-1100 m....

SE de Europa, Anatolia, N del Irán y el Turkestán; como naturalizada, en muchas otras zonas. Dispersa por la Península Ibérica; naturalizada a veces ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lychnis-coronaria.html>

Hypericum pulchrum L.

Hierba perenne, glabra, de hasta 100 cm. Tallos rubescentes, con ramas estériles y sin líneas. Hojas de los tallos principales 11-24 x 7-11 mm -relació...

Ocupa orlas y claros de encinares, quejigares, melojares, hayedos, etc., formando parte de jarales y brezales. También en orillas de arroyos, cunetas ...

Norte, oeste y centro de Europa. Galicia y zonas cantábrica y subcantábrica, N y C de Portugal, N del Sistema Ibérico, Sistema Central y NE de Catalu...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hypericum-pulchrum.html>

Chamaecyparis nootkatensis (D. Don) Spach

Chamaecyparis nootkatensis es un árbol con la corteza pardo grisácea que se separa en escamas grandes y delgadas. Ramas lisas, de color castaño, con r...

Planta ornamental cultivada en muchos parques y jardines. Vive en climas frescos y húmedos, no prosperando bien en zonas bajas o litorales. ...

El ciprés de Nootka es nativo de la costa oeste de Norteamérica, desde la península de Kenai en Alaska, hacia el sur, hasta el extremo septentrional d...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/chamaecyparis-nootkatensis.html>

Carex echinata Murray

Rizoma cespitoso, en ocasiones con un tramo vertical al final del cual surgen los brotes fértiles. Tallos (5)15-40(50) cm, trígonos, con los ángulos ...



Turberas y prados muy húmedos, generalmente sobre substratos silíceos; 15-3100 m....

Gran parte de Europa, W de Asia, Norteamérica y N de África. Mitad N de la Península (sobretudo en áreas de montaña) y Sierra Nevada....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/carex-echinata.html>

Carex distans L.

Cespitosa, con rizoma no muy robusto. Tallos fértiles (15)25-60(100) cm, lisos, obtusamente trígono. Hojas (1,5)2-4(5) mm de anchura, de menor longit...

Prados húmedos, bordes de arroyos y lagunas, juncales marítimos, tobas calizas y todos los suelos húmedos en substratos ricos en sales minerales, pri...

La mayor parte de Europa, N de África, W y C de Asia, hasta el extremo W de China. En la Península Ibérica se distribuye principalmente por su mitad...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/carex-distans.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Ambrosia psilostachya DC. (Magnoliophyta)

Croesus septentrionalis (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Gyroporus castaneus (Bull.) Qué. (Basidiomycota)

Lavandula canariensis Mill. (Magnoliophyta)

Leucothoë fontanesiana (Steud.) Sleumer (Magnoliophyta)

Loropetalum chinense Oliv. (Magnoliophyta)

Myoporum laetum G.Forst. (Magnoliophyta)

