



Num. 656. Publicado el 23/10/2017

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Huperzia selago subsp. selago*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 656. Publicado el 23/10/2017

Descripciones de especies

Saxifraga pubescens Pourr.

Planta perenne, densamente pulvinular o cespitosa, con indumento denso formado por glándulas -inmersas, sésiles y estipitadas- y pelos glandulíferos ...

Pastos pedregosos, pedregales y fisuras de roquedos, en substrato básico o ácido; (1900)2000-3200(3375) m. ...

Pirineos....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/saxifraga-pubescens.html>

Pedicularis foliosa L.

Hierba perenne con raíces fasciculadas, cilíndricas, de 2-8 mm de diámetro. Rizoma hasta de 10 mm de diámetro, vertical u oblicuo, simple, corto, leñ...

Prados mesohigrófilos, repisas y base de roquedos sombríos, herbazales megafórbicos, claros de bosques mesófilos (hayedos, abetales), etc., principal...

Sistemas montañosos del W y S de Europa. Montañas del N peninsular, desde los Pirineos hasta la Cordillera Cantábrica....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pedicularis-foliosa.html>

Cladonia squamosa (Scop.) Hoffm.

Liquen fruticuloso con podocios de color verde grisáceo pálido, generalmente poco ramificados, fistulosos, con ápices abiertos o perforados, poco ensa...

Es frecuente sobre rocas, suelos ácidos y madera en descomposición en bosques de coníferas y brezales....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cladonia-squamosa.html>

Astrantia minor L.

Hierba perenne, de 15-30(50) cm, menuda. Tallos simples -muy rara vez ramificados en la mitad superior-. Hojas basales de dos tipos, a menudo, en la...

Comunidades de megaforbias, rellanos y pies de roquedos, matorrales de azalea de montaña (*Rhododendron ferrugineum*), en substrato silíceo; (1850)2100-...

Centro y sur de Europa. Pirineos...



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/astrantia-minor.html>

Apoderus coryli (Linnaeus, 1758)

Curculiónido con una longitud de 6 a 8 milímetros. Cabeza brillante de color negro o marrón oscuro con ojos hemisféricos, salientes, y un "cuello" dis...

Sus larvas alimenta de hojas de *Corylus avellana*....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/apoderus-coryli.html>

Novedades corológicas

Cerebratulus roseus (Delle Chiaje, 1841) (Nemertina)

Primera cita para Galicia - Citado por Marcos Fernández Iglesias en HIO (RESTO PARROQUIA), A medio camino entre Punta Fusiño y Cabo Pequeño, en el tercio sureste del espolón rocoso entre la Playa de Barra y Punta Subrido., Cangas. PONTEVEDRA el día 19/10/2017

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/fauna-invertebrados/cerebratulus-roseus-1/30360.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Anostirus parumcostatus (Buysson, 1894) (Arthropoda)

Apoderus coryli (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Cerebratulus roseus (Delle Chiaje, 1841) (Nemertina)

Cladonia squamosa (Scop.) Hoffm. (Ascomycota)

Coccus hesperidum Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

Diastrophus rubi (Bouché, 1834) (Arthropoda)

Myrsine africana L. (Magnoliophyta)

Nephrolepis cordifolia (L.) C.Presl (Pteridophyta)

Osmanthus heterophyllus (G.Don) P.S.Green (Magnoliophyta)

Osmanthus x burkwoodii (Burkwood & Skipwith) P.S.Green (Magnoliophyta)



Saxifraga pubescens Pourr. (Magnoliophyta)

