



## Num. 663. Publicado el 11/12/2017

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Podarcis sicula*. Por Juan Luis Menéndez



**Num. 663. Publicado el 11/12/2017**

## Descripciones de especies

### *Thymelaea broteriana* Cout.

Planta perenne, hasta de 40(50) cm de altura, de sufruticosa y más o menos cespitosa aarbustiva y más o menos erecta; dioica -excepcionalmente con a...

*Thymelaea broteriana* vive en brezales aclarados de *Erica australis* y/o *Erica umbellata*, siempre sobre suelos ácidos (pizarras o granitos). En las pobl...

Endémica del noroeste de la Península Ibérica. En Portugal se distribuye por Douro Litoral, Minho y Tras os Montes, y en España por las provincias de ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/thymelaea-broteriana.html>

### *Spergula morisonii* Boreau

Hierba anual, a veces al parecer bienal con tallos 5-30 cm, generalmente ascendentes, glabros o esparcidamente pubescentes. Hojas de 2-20 mm, lineares...

Campos incultos y pastos secos más o menos alterados. en suelos arenosos; (550)700-2500 m. ...

C y SW de Europa, Escandinavia, Argelia. Principalmente en el C y mitad W de la Península. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/spergula-morisonii.html>

### *Sesamoides purpurascens* (L.) G. López

Planta perenne o bienal, a menudo glauca; cepa indivisa con los tallos del añonaciendo de las axilas de las hojas de la roseta basal, o ramificada y...

Pastos y matorrales despejados, preferentemente en terrenos silíceos más o menos arenosos, pero también en serpentinias, dolomías cristalinas y caliza...

Región mediterránea occidental Italia. Dispersa por gran parte de la Península Ibérica, pero falta en gran parte del N y se hace rara hacia el E...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sesamoides-purpurascens.html>

### *Mogulones larvatus* (Schultze, 1897)

Curculiónido con un tamaño de 3.5-4 mm, con el cuerpo recubierto por escámulas piliformes de color marrón oscuro; el diseño dorsal está formado por es...

Se encuentra sobre *Echium vulgare*, habiendo sido citado sobre otras Boragináceas como *Echium grandiflorum*, *Pulmonaria officinalis*, *Symphytm*



official...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/mogulones-larvatus.html>

## *Bartramia ithyphylla* Brid.

Platas de medio tamaño, verde amarillentas o pardo verdosas, dispuestas en densos grupos. Caulidios pardo rojizos, erectos, de hasta 3.5 cm, raramente...

En suelos arenosos o rocas....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/bartramia-ithyphylla.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Altica brevicollis* Foudras, 1860 (Arthropoda)

*Erodium rupicola* Boiss. (Magnoliophyta)

*Mogulones larvatus* (Schultze, 1897) (Arthropoda)

