



## Num. 664. Publicado el 18/12/2017

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Sphingonotus caerulans*. Por José Rafael González López



**Num. 664. Publicado el 18/12/2017**

## Descripciones de especies

*Sphingonotus caerulans* (Linnaeus, 1767)

El saltamontes de alas azules es un ortóptero cuyos machos tienen una longitud de 14 a 26 mm mientras que las hembras miden de 20 a 31 mm.  
Coloración ...

Vive en prados arenosos, dunas, zonas con gravas, más raramente en áreas rocosas....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sphingonotus-caerulans.html>

*Orobanche teucrii* Holandre

Planta anual o perenne con un tallo de 15-30 x 0,4-0,6 cm, simple, con pelos glandulíferos, de un amarillo grisáceo. Hojas 10-15 x 6 mm, lineal-lanceo...

Parásita de diferentes especies de *Teucrium*, en pastos, matorrales, dunas, etc., en calizas; 0-2000...

N de España, C y E de Francia, Alemania, Suiza y otros países de Europa central y, quizás, en Rusia. Cordillera Cantábrica, Pirineos y Prepirineos ori...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/orobanche-teucrii.html>

*Ononis diffusa* Ten.

Hierba anual, hasta de 60 cm, erecta, ascendente o procumbente. Tallos ramificados en la base, peloso-glandulosos, con pelos no glandulíferos...

Pastizales, en dunas y arenales costeros y del interior; 0-30(600) m....

Regiones mediterránea y macaronésica (Canarias, Madeira y Azores). Litoral de la Península Ibérica (desde Valencia hasta Cantabria), C de Portugal y ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ononis-diffusa.html>

*Lepidium virginicum* L.

Planta anual, raramente bienal, unicaule, pubescente, raras veces glabra. Raíz fusiforme. Tallo 30-50 cm, erecto, ramificado en la parte superior, co...

Campos de cultivo, bordes de caminos, etc.; 0-1000 m....

Originaria del N de América; introducida en Europa, África, Macaronesia y Australia. Regiones litorales del W y entodo el N de la Península



Ibérica...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lepidium-virginicum.html>

*Anthyllis vulneraria subsp. alpestris* (Kit. ex Schult.) Asch. & Graebn.

Perenne, cespitosa con tallos de 10-30(40) cm, erecto-ascendentes, herbáceos, seríceos, a veces glabrescentes en la base, ramosos desde la base. Hojas...

Pastos pedregosos, rellanos de crestas y cantiles, a veces como subrupícola; calcícola; (500)1200-2200(2500) m....

Montañas del S de Europa (Cordillera Cantábrica, Pirineos, Sistema Ibérico, Alpes, Cárpatos y W de los Balcanes). Cordillera Cantábrica, Montes de Le...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/anthyllis-vulneraria-subsp-alpestris.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Sphingonotus caerulans* (Linnaeus, 1767) (Arthropoda)

