



Num. 669. Publicado el 22/01/2018

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Pyrus calleryana*. Por César Fernández González



Num. 669. Publicado el 22/01/2018

Descripciones de especies

Trifolium squamosum L.

Hierba anual, más o menos pelosa. Tallos 4-60 cm, erectos, rara vez ascendentes o procumbentes, glabros, glabrescentes o con pelos adpresos en la par...

Herbazales encharcados, con frecuencia de suelos salobres; 0-1000 m....

Diseminada por el C, S y W de Europa, SW de Asia y N de África, especialmente en las regiones costeras; región macaronésica (Azores, Madeira y Canari...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/trifolium-squamosum.html>

Stachys alpina L.

Hierba 60-90 cm, perenne, rizomatosa, pelosa. Tallos erguidos, con cantos redondeados color pardo, diferente del de las caras, con pelos tectores más...

Praderas o formaciones de megaforbios en sotobosques o en terrenos con cierta humedad, a veces nitrófilos, en substratos silíceos o calizos; 90-1600 m...

Oeste y C de Europa, región mediterránea. N y C de la Península Ibérica....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/stachys-alpina.html>

Sideritis lurida J. Gay

Sufrútice 17-57 cm, con estolones. Tallos generalmente simples, a veces divididos, más o menos pelosos, con pilosidad en caras opuestas y alternas en...

Claros de matorral, de encinar o de robledal, en baldíos, en substratos pedregosos y silíceos; 750-2200 m....

Cuadrante NW de España. NW de la submeseta N y Sierra de Gredos....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/sideritis-lurida.html>

Euphorbia serrata L.

Planta perenne, que rara vez florece en el primer año, multicaule, rizomatosa, glabra, más o menos glauca. Rizoma grueso - 2 cm de diámetro-, rematad...

Campos de cultivo, comunidades herbáceas nitrófilas en lugares ruderalizados, matorrales degradados y pastos sobrepastoreados, en general prefiere



te...

Oeste de la región mediterránea y Macaronesia (Canarias), introducida en Norteamérica y Sudáfrica. Dispersa por casi toda la Península (más frecuente...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/euphorbia-serrata.html>

Equisetum hyemale L.

Tallos de hasta 1 m, simples o escasamente ramosos al romperse el tallo principal, verdes, con c. de 20 costillas, más o menos convexas, cada una con ...

Bosques húmedos y umbrosos, bordes de cursos de agua; 0-2000 m....

Zonas templadas y frías del Hemisferio Norte. Mitad N de la Península....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/equisetum-hyemale.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Elaeagnus xebbingei J.Door. (Magnoliophyta)

Heliophanus melinus L. Koch 1867 (Arthropoda)

Pyrus calleryana Decne (Magnoliophyta)

