



## Num. 678. Publicado el 26/03/2018

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Loreleia marchantiae*. Por Francisco Javier Linares Ferreiro



**Num. 678. Publicado el 26/03/2018**

## Descripciones de especies

### *Reseda lanceolata* Lag.

Planta anual o bienal, en general unicaule. Tallos 60-115 cm, erectos, escasamenteramificados en la parte superior, glabros y glaucos. Hójas 80-150 x...

Taludes, bordes de caminos, terrenos incultos, en suelos secos margosos o esquistosos; 50-1200 m...

S de la Península Ibérica y NW de África....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/reseda-lanceolata.html>

### *Pilosella castellana* (Boiss. & Reut.) F.W. Sch. & Sch. Bip.

Hierba perenne con estolones abundantes y alargados, surgiendo radialmente desde las rosetas, con una parte rastrera provista de hojas abundantes, sí...

Claros de robledales y pinares, majadales y pastizales secos sobre suelo silíceo poco profundo. (500) 800-2100 m. ...

Península Ibérica y Magreb. Áreas continentales del centro y norte peninsular....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pilosella-castellana.html>

### *Peucedanum carvifolia* Crantz ex Vill.

Planta perenne. Rizoma leñoso, de 6-8 mm de diámetro, vertical u oblicuo. Cepa con algunos restos fibrosos en la parte superior. Tallo 20-60(130) cm,...

Herbazales de montaña, zonas de matorral abierto, brezales, y orlas de robledales y hayedos, en suelos algo pedregosos, secos o húmedos, tanto en sub...

Centro y sur de Europa, hasta el NW de Holanda y la zona meridional del E de Rusia, donde alcanza el Cáucaso, ya en Asia. Desigualmente repartido por ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/peucedanum-carvifolia.html>

### *Lutraria oblonga* (Gmelin, 1791)

Bivalvo con la concha de hasta 120 mm de longitud, elongada, oblonga, con el margen dorsal distintamente cóncavo en la zona posterior al umbo, con cas...

En arenas conchíferas....



Desde el Canal de la Mancha hasta el Mediterráneo y el NO de África...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lutraria-oblonga.html>

*Loreleia marchantiae* (Singer & Clémençon) Redhead

Hongo que desarrolla cuerpos fructíferos con un sombrero pequeño, de hasta 1,5 (...)

*Loreleia marchantiae* se comporta como un parásito débil o como saprobionte de diferentes hepáticas vivas o muertas de los géneros *Marchantia*, *Conoceph...*

Por LINARES FERREIRO, F. J.

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/loreleia-marchantiae.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Cucullia lucifuga* (Denis & Schiffermüller, 1775) (Arthropoda)

*Loreleia marchantiae* (Singer & Clémençon) Redhead (Basidiomycota)

*Reseda lanceolata* Lag. (Magnoliophyta)

*Thaumetopoea herculeana* (Rambur, 1840) (Arthropoda)

*Udea rhododendronalis* (Duponchel, 1834) (Arthropoda)

ISSN 1887-5068

