



Num. 683. Publicado el 30/04/2018

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Picus viridis*. Por Pilar Fatou



Num. 683. Publicado el 30/04/2018

Descripciones de especies

Polygala serpyllifolia Hosé

Hierba hasta de 15 cm, perenne. tallo más o menos decumbente, más o menos ramificado desde labase, acostillado, salpicado de pelos crespos o glabro,...

Pastos, claros de bosque de caducifolios, raramente en pinares, matorrales abiertos, brezales, bordes de arroyo y turbera, rellanos de roquedo, en su...

Groenlandia y Europa atlántica, desde el SW de Escandinavia y dinamarca hastala Península Ibérica, introducida en las Azores. Cornisa cantábrica, Ga...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/polygala-serpyllifolia.html>

Odontitella virgata (Link) Rothm.

Hierba anual, pelosa, más o menos escabriúscula, con pelos unicelulares tectores, cortos—hasta de 0,5 mm—, y en ocasiones glándulas minúsculas. Tall...

Pastos secos entre diversos tipos de matorral (jarales, brezales, tomillares, etc.) o de etapas aclaradasde bosques (encinares, alcornocales, quejig...

Endémica de la mitad occidental de la Penínsulalbérica, salvo en el extremo N, y extendiéndose por el C y E hasta la cabecera de la cuenca del Ebro ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/odontitella-virgata.html>

Montia fontana subsp. *chondrosperma* (Fenzl) Walters

Hierba anual o vivaz. Tallo 5-50 cm, a veces de mayor tamaño cuando seencuentra en el agua, ramificado en los nudos inferiores, ramas muy delgadas....

Coloniza hábitat con menor humedad que la subespecie anterior, bordes de pantanos, praderas y terrenosarenosos húmedos, raras veces en corrientes de...

C y S de Europa, América, Australia, Nueva Zelanda. Dispersa por la Península, excepto, al parecer, el cuadrante SE...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/montia-fontana-subsp-chondrosperma.html>

Melilotus segetalis (Brot.) Ser.

Hierba anual, glabra o con pelos adpresos dispersos. Tallos 15-100 cm, erectos, fistulosos, ramificados desde la base, rojizos en la mitad inferior. H...

Arvense, ruderal y viaria, de suelos margosos, arcillosos o salinos cercanos al mar; 0-500(900) m....



Oeste de la región mediterránea. Zonas costeras de la Península Ibérica y Baleares, más rara en el N. E...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/melilotus-segetalis.html>

Carex sylvatica Huds.

Planta cespitos acon tallos fértiles 20-70(200) cm, lisos, agudamente trígono. Hojas(2)4-7(12) mm de anchura, de menor longitud que los tallos, plan...

Hayedos, robledales y bosques riparios; 50-1800 m....

Europa y puntos aislados del W de Asia y N de África; introducida en el E de Norteamérica y Nueva Zelanda. Montañas de la mitad Nde la Península (s...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/carex-sylvatica.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Cyanopica cooki Bonaparte, 1850 (Chordata)

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) (Chordata)

Montia fontana L. (Magnoliophyta)

