



## Num. 684. Publicado el 07/05/2018

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Reseda media*. Por Ignacio Fernández Villar



**Num. 684. Publicado el 07/05/2018**

## Descripciones de especies

### *Scleranthus annuus* L.

Planta herbácea anual o bienal, de 2-25 cm, de porte muy variable, con tallos de postradosa erectos; entrenudos 1-5 cm, en general apreciablemente m...

Campos de cereales o lugares alterados y ruderalizados; 400-1300(1900) m....

Originaria de la región mediterránea, actualmente introducida en toda Europa, gran parte de Asia, N y S de África, N y C de América. Dispersa por la P...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/scleranthus-annuus.html>

### *Fumaria bastardii* Boreau

Planta herbácea suberecta o difusa, raramente trepadora. Hojas 2-4 pinnatisectas, en las plantas jóvenes las basales ternadas; segmentos foliares oblo...

Terrenos cultivados o abandonados....

Ampliamente distribuida en la región mediterránea y el W de Europa; naturalizada en otras partes del mundo. Dispersa por gran parte de la Península. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/fumaria-bastardii.html>

### *Erodium glandulosum* (Cav.) Willd.

Hierba 3-22 cm, perenne, acaule; cepa leñosa, ramificada. Hojas todas basales, con limbo de 2,4-18 x 1,3-2,8 cm, triangular-ovada, bipinnatisectas -co...

Laderas pedregosas, fisuras de roca, rellanos y crestones calizos, más raro en esquistos; 500-2100....

S de Francia -S de Altos Pirineos, Ariège y Pirineos Orientales- y N y E de la Península Ibérica. Montes de León, Cordillera Cantábrica, Montes vascos...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/erodium-glandulosum.html>

### *Dryocopus martius* (Linnaeus, 1758)

El pito negro es un pájaro carpintero grande, de 45-57 cm de longitud y 64-68 cm de envergadura. El macho adulto presenta un plumaje negro brillante c...



El picamaderos negro está ligado a bosques extensos y maduros de hayas y coníferas. Mientras que en Pirineos prefiere instalarse en formaciones montan...

Distribución paleártica. Cría en zonas aisladas de Europa occidental y meridional, con ocupación continua del centro y norte, y en una faja media de A...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/dryocopus-martius.html>

## *Arabis hirsuta* (L.) Scop.

Planta de 15-35(50) cm, frecuentemente pluricaule. Indumento formado por pelos de c. 1 mm, patentes, la mayoría simples o bifurcados. Tallos hirsutos...

Pedregales, fisuras de rocas, claros de bosque, en suelos calcáreos; 5-2000 m....

Holártica. Mitad N de la Península Ibérica, Sierra Nevada y Sierra de Baza....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/arabis-hirsuta.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Chilocorus renipustulatus* (Scriba, 1790) (Arthropoda)

*Dendrocopos minor* (Linnaeus, 1758) (Chordata)

*Empis trigramma* Wiedemann in Meigen, 1822 (Arthropoda)

*Fumaria bastardii* Boreau (Magnoliophyta)

*Ononis ramosissima* Desf. (Magnoliophyta)

*Pyrrhocorax pyrrhocorax* (Linnaeus, 1758) (Chordata)

