



## Num. 687. Publicado el 28/05/2018

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Quercus ilex*. Por Juan Luis Menéndez



**Num. 687. Publicado el 28/05/2018**

## Descripciones de especies

### *Pittosporum tobira* (Thunb.) W.T. Aiton

Arbusto o arbolillo 2-6 m abundantemente ramificado. Hojas de 3,5-10 x 1,5-4 cm, agrupadas en el ápice de las ramas, obovadas, oblongo-obovadas, a vec...

Ornamental y cultivada; escapada en algunas localidades de bosque y matorral; 0-100 m....

Originaria del S del Japón, S de Corea e islas adyacentes y costa oriental de China; naturalizada en otras regiones. Dispersa por el W y SW de Portug...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pittosporum-tobira.html>

### *Hypomyces cervinigenus* Rogerson & Simms

Esta especie de *Hypomyces* es fácil de identificar ya que se encuentra parasitando especies de *Helvella*, las cuales cubre de un polvillo alrededor de l...

Sobre diferentes especies de *Helvella*....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hypomyces-cervinigenus.html>

### *Hirschfeldia incana* (L.) Lagr.-Foss.

Planta herbácea con tallo de hasta 120(140) cm, habitualmente folioso, ramificado, especialmente en la parte superior, densamente peloso. Hojas inferi...

Ruderal, en caminos, cunetas, baldíos, también en campos cultivados; 0-2200 m. ...

Regiones mediterránea y irano-turana; introducida en muchos otros países. Muy frecuente en casi todas las provincias....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hirschfeldia-incana.html>

### *Ciconia nigra* (Linnaeus, 1758)

La cigüeña negra es un ave de 90-105 cm de longitud y 170-205 cm de envergadura. Su color presenta predominantemente tonos oscuros. El adulto tiene to...

Se trata de un ave muy esquiva, pero suele verse en vuelo en la cercanía de sus nidos o vadeando orillas de ríos o embalses, así como prados húmedos. ...

*Ciconia nigra* aparece en tres núcleos aparentemente disyuntos: Europa —desde la Península Ibérica hasta países del Este—, Asia (población poco



conocid...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ciconia-nigra.html>

## *Charaxes jasius* (Linnaeus, 1767)

Mariposa de gran tamaño, que alcanza una envergadura alar de 65-75 mm, en los machos y de 75-90 mm en las hembras. El anverso de las alas se caracteri...

Las larvas se alimentan de *Arbutus unedo* (madroño), *Sorghum roxburghii*, *Lonchocarpus cyanescens*, *Cassine* sp.. Los adultos vuelan en dos generaciones, ...

Centro y el Norte de África, que no hace mucho debió penetrar en las costas mediterráneas europeas. Actualmente se encuentra en colonias aisladas en l...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/charaxes-jasius.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Aquila adalberti* C. L. Brehm, 1861 (Chordata)

*Ciconia nigra* (Linnaeus, 1758) (Chordata)

*Colchicum lusitanum* Brot. (Magnoliophyta)

*Corvus corax* Linnaeus, 1758 (Chordata)

*Hypomyces cervinigenus* Rogerson & Simms (Ascomycota)

*Pittosporum tobira* (Thunb.) W.T. Aiton (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008