



Num. 688. Publicado el 04/06/2018

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Cleome violacea*. Por José Rafael González López



Num. 688. Publicado el 04/06/2018

Descripciones de especies

Viola kitaibeliana Schult.

Planta herbácea anual, de (2)4-25 cm, enana muchas veces. Hojas mayores con el limbo de ovado a oval o redondeado -de menos de 1 cm de anchura, típicam...

Arenales, incluso marítimos, sitios incultos de índole varia, claros de matorral, cultivos. etc.; anual oportunista; 0-1850 m....

Oeste, centro y sur de Europa, hasta Ucrania y el Cáucaso, Turquía, Siria, NW de África y Canarias. Dispersa por toda la Península Ibérica, incluso e...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/viola-kitaibeliana.html>

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, 1951

Dryocosmus kuriphilus es una especie univoltina (completa una generación al año) y se reproduce por partenogénesis, proceso mediante el cual se desar...

Dryocosmus kuriphilus puede afectar a *Castanea crenata*, *Castanea mollissima*, *Castanea sativa* y sus híbridos, y en menor medida a *Castanea seguini*. Es ...

Es originario de China, y comenzó a propagarse en 1941 en Japón y en 1963 en Corea. En el continente americano fue detectado en 1974 en EE.UU. y en E...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/dryocosmus-kuriphilus.html>

Colchicum lusitanum Brot.

Planta herbácea provista de un bulbo de (2)3-5(6,5) x (2)3-4,5(6) cm; túnicas coriáceas, de un pardo oscuro acasi negras; catafilo con el ápice lib...

Pastos secos en baldíos, zonas pedregosas, claros de diversos tipos de bosque o matorral, olivares, taludes, a veces en pastos húmedos profundos, con ...

Mediterráneo occidental. Gran parte de la Península, salvo el NE y C, frecuente sobretodo en el tercio meridional. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/colchicum-lusitanum.html>

Cleome violacea L.

Planta herácea anual con tallos 9-60 cm, erectos, ramosos. Hojas inferiores pecioladas, trifoliadas; las superiores, sésiles o subsésiles, simples; fol...

En terrenos pedregosos o arenosos, cultivados o en barbecho; 0-1400 m....



Norte de África y Península Ibérica. Principalmente W y S de la Península....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cleome-violacea.html>

Aeonium arboreum Webb & Berthel

Pequeño arbustillo de hasta 1,5(2)m, con tallos erectos, ramificados; ramaserectas o ascendentes, más o menos carnosas, de 1-3 cm de diámetro, lisas...

Acantilados, cunetas, muros del litoral; 0-200 m....

Oriunda de Canarias, naturalizada y escapada de cultivo en el litoral, desde Galicia hasta las Islas Baleares...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/aeonium-arboreum.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Cleome violacea L. (Magnoliophyta)

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, 1951 (Arthropoda)

