



Num. 69. Publicado el 03/04/2006

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Cortinarius dionysae*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 69. Publicado el 03/04/2006

Descripciones de especies

Tylodina perversa (Gmelin, 1791)

Opisthobranchio de hasta 3 - 5 cm de longitud, con el pie ancho y largo. En la parte dorsal tiene una concha cónica aplanada, con el ápice ligeramente ...

Sobre *Aplysina aerophoba*, de la que se alimenta, obteniendo de ella las sustancias que le proporcionan el tono amarillo. Por esto es por lo que es tan...

Desde el Mediterráneo hasta al menos las Islas Británicas. No es abundante....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/tylodina-perversa.html>

Plantago maritima L.

Hierba perenne, de 5-40 cm, acaule, con hojas de 50-200(380) x (0,5)1-10(15) mm, dispuestas en varias rosetas basales, de lineares a linear-lanceolada...

Acantilados marítimos y marismas del litoral y, en el interior, en suelos arcillosos y margosos algo húmedos, a veces salinos; 0-1800(2300) m....

Europa y América; citada también del Mediterráneo occidental y C de Asia. Litoral atlántico -desde el N de Portugal hasta el País Vasco-, mitad E de l...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/plantago-maritima.html>

Musculus discors (Linnaeus, 1767)

Pequeño bivalvo, de unos 12 mm de longitud. La concha es bastante frágil, equivalva pero de lados desiguales y de contorno romboidal. Los umbos, subte...

Forma densas agregaciones sobre estipes de algas (*Fucus*, *Laminaria*) o sobre céspedes de pequeños animales (briozoos) en aguas poco profundas. Al repro...

Desde el Mar del Norte al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/musculus-discors.html>

Marionia blainvillea (Risso, 1818)



Nudibranchio de gran tamaño, que puede llegar a medir 8 cm de longitud. Presenta el velo cefálico que caracteriza a la familia, grande, con dos lóbulos...

Sobre corales y gorgonias como *Alcyonium acaule*, *Alcyonium palmatum*, *Eunicella* sp., *Leptogorgia sarmentosa* y *Paramuricea clavata* entre 5 y unos 30 - 5...

Mediterráneo y Atlántico adyacente....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/marionia-blainvillea.html>

Lichia amia (Linnaeus, 1758)

Pez de cuerpo alargado y ligeramente ovalado y comprimido lateralmente que llega a medir hasta 2 m como máximo, aunque por lo general mide alrededor d...

Pelágico, vive cerca de la costa, hasta unos 50 m de profundidad y 200 - 300 de distancia, aunque puede penetrar en los estuarios, especialmente en la...

Desde el Cantábrico a Sudáfrica y el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lichia-amia.html>

Eunice torquata Quatrefages, 1865

Poliqueto de cuerpo alargado y cilíndrico que alcanza los 25 cm de longitud. El prostomio tiene 2 ojos, 2 palpos y 5 antenas, la central más larga y l...

En aguas poco profundas, generalmente bajo piedras....

Desde el Canal de la Mancha al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/eunice-torquata.html>

Erylus discophorus (Schmidt, 1862)

Esponja lobulada y voluminosa, a veces incrustante, de color pardusco. Superficies aferentes y eferentes uniporales con grandes ósculos. Esqueleto for...

Hendiduras, grietas, en zonas umbrías, hasta unos 5 m de profundidad....

Atlántico y Mediterráneo....

Por asturnatura.com



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/erylus-discophorus.html>

Carex arenaria L.

Planta perenne con tallos de 10 - 40 (90) cm de longitud, con rizomas reptantes. Hojas de 1,5 - 4 (5) mm de ancho y tan largas como los tallos, con líg...

Dunas y arenales marítimos, hasta los 30 m de altura....

Costa norte de Europa. En España es común en el norte mientras que en el Mediterráneo apenas se conocen poblaciones....

Por [asturnatura.com](http://www.asturnatura.com)

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/carex-arenaria.html>

Auxis rochei (Risso, 1810)

Pez de cuerpo robusto, alargado y redondeado, que llega a medir los 50 cm, aunque generalmente su longitud es menor. En la cabeza los ojos están adela...

Los adultos aparecen principalmente en aguas costeras y cercanas a islas, formando bancos generalmente hasta unos 10 m de profundidad. Se alimenta de ...

Cosmopolita. Presente en el Atlántico desde el Canal de la Mancha hasta el sur, en el Índico y el Pacífico. También en el Mediterráneo....

Por [asturnatura.com](http://www.asturnatura.com)

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/auxis-rochei.html>

Antho involvens (Schmidt, 1864)

Espanja que forma finos parches incrustantes, de textura lisa, a veces arrugada y ligeramente hispida. Los ostiolos son pequeños y no siempre visibles...

En superficies inclinadas tanto en zonas expuestas como calmadas....

Desde las Islas Británicas al Mediterráneo, es la esponja roja más abundante del Cantábrico....

Por [asturnatura.com](http://www.asturnatura.com)

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/antho-involvens.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Callianassa subterranea (Montagu, 1808) (Arthropoda)



Cetonia aurata (Arthropoda)

Geranium pyrenaicum Burm. f. s.l. (Magnoliophyta)

Hymenophyllum tunbrigense (L.) Sm. (Pteridophyta)

Ligusticum lucidum Mill. (Magnoliophyta)

Symphytum tuberosum L. (Magnoliophyta)

Viola palustris L. s.l. (Magnoliophyta)

Woodwardia radicans (L.) Sm. (Pteridophyta)

