



Num. 694. Publicado el 16/07/2018

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Saxifraga longifolia*. Por Ignacio Fernández Villar



Num. 694. Publicado el 16/07/2018

Descripciones de especies

Timandra comae Schmidt, 1931

Timandra Comae es un geométrico con una envergadura de 23-28 mm, con alas de color pajizo cruzadas por una línea rojiza longitudinal. Cuando el adulto ...

Timandra comae vive en aquellos hábitats donde su planta nutricia, que son especies de los géneros Rumex y Polygonum son abundantes, como claros y orl...

Desde el norte de África, Europa y este de Asia....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/timandra-comae.html>

Saxifraga aquatica Lapeyr.

Planta perenne, densamente cespitosa, que alcanza a cubrir en ocasiones superficiesde más de 1 m2 por medio de cortos estolones, cubierta de glándul...

Arroyos y manantiales de agua fría, en substrato ácido; (1600)1700-2700 m....

Pirineoscentral y oriental....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/saxifraga-aquatica.html>

Phlomis lychnitis L.

Sufrútice de 14,5-70 cm, a veces con estolones. Tallos erguidos, a veces arqueados,los estériles con hojas en el extremo, densamente pelosos, sobre ...

Matorrales y tomillares, baldíos y lugares nitrificados, en cualquier substrato, preferentemente enpedregales calizos; 20-2000 m....

Península Ibérica y S de Francia. Toda la Península Ibéricasalvo el NW y la cornisa cantábrica. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/phlomis-lychnitis.html>

Neanthes fucata (Savigny) Campoy, 1982

Anélido poliqueto de cuerpo largo, hasta unos 20 centímetros de longitud formado por unos 120 segmentos, bastante ancho en su parte media, pero que se...

Neanthes fucata es un poliqueto comensal con el cangrejo ermitaño Pagurus bernhardus, que vive en conchas de gasterópodos. North Sea, Kattegat, En...



Atlántico norte, Mediterráneo y Mar Negro....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/neanthes-fucata.html>

Mitrella pallaryi Dautzenberg, 1927

Gasterópodo de pequeño tamaño, de en torno a 12-15 milímetros de alto, con la concha de silueta fusiforme, con unas 8 vueltas de espira, no muy aguda ...

Sublitoral....

Por FERNÁNDEZ IGLESIAS, Marcos

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/mitrella-pallaryi.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Androsace vitaliana subsp. vitaliana (L.) Lapeyr. (Magnoliophyta)

Cicerbita alpina Wallr. (Magnoliophyta)

Colomastix pusilla Grube, 1861 (Arthropoda)

Iberolacerta aurelioi Arribas, O. 1994 (Chordata)

Minuartia sedoides (L.) Hiern (Magnoliophyta)

Mitrella pallaryi Dautzenberg, 1927 (Mollusca)

Phlomis herba-venti L. (Magnoliophyta)

Phlomis lychnitis L. (Magnoliophyta)

Santolina oblongifolia Boiss. (Magnoliophyta)

Sceliphron curvatum (Smith, 1870) (Arthropoda)

Sceliphron spirifex (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Solorina saccata (L.) Ach. (Ascomycota)

ISSN 1887-5068

