



## Num. 705. Publicado el 01/10/2018

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Phylloscopus trochilus*. Por César Fernández González



**Num. 705. Publicado el 01/10/2018**

## Descripciones de especies

### *Valeriana officinalis subsp. officinalis* L.

Hierba perenne, por lo general monocaule, estolonífera o no, con rizomasimple. Tallos hasta de 230 cm, erectos, generalmente ramificados solo en la ...

Prados muy húmedos de orlas y claros de bosque, fondos de valle, vaguadas umbrosas y márgenesde cursos de agua, etc., más o menos nitrófila; 30-2000...

Europa, y W, C y N de Asia.Mitad N de la Península Ibérica....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/valeriana-officinalis-subsp-officinalis.html>

### *Serinus serinus* (Linnaeus, 1766)

El verdecillo es un fringílido pequeño, de 11.5 cm de longitud y 20-23 cm de envergadura, con un pico ancho pero muy corto y una cola con una notoria ...

El verdecillo selecciona prioritariamente las plantaciones de cítricos y olivos para la cría pero también es frecuente en bosques abiertos, siendo alg...

Especie distribuida por el noroeste de África y toda Europa, a excepción de gran parte de Escandinavia. En los dos últimos siglos ha aumentado sensibl...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/serinus-serinus.html>

### *Pimpinella saxifraga* L.

Planta perenne, de 25-80 cm, ramificada, erecta, con raíz axonomorfa, hasta de15 cm. Tallos sólidos, cilíndricos, finamente estriados, pelosos -pelo...

Pastos, claros de bosque, preferentemente en substrato calizo; 0-2300 m....

Toda Europa, excepto el extremo meridional. N de la Península y montañas del C y E....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pimpinella-saxifraga.html>

### *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newman

Helecho con un rizoma alargado, densamente revestido de páleas de color castaño.Frondes de (10)20-50(60) cm, persistentes; pecíolo de subigual a 1/3 d...

Bosques, muros y roquedos umbrosos y húmedos, desde el nivel del mar a los 2000 m....



Europa, región mediterránea, Azores y Madeira. Frecuente en el N de la Península, más raro y sólo en los sistemas montañosos hacia el S y en Mallorca....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/phyllitis-scolopendrium.html>

## *Phoenicurus phoenicurus* (Linnaeus, 1758)

Pequeño tórido de 14 cm de longitud y 22-24 cm de envergadura, con una llamativa cola rojiza. El macho es llamativo y colorido, ya que su pecho es na...

El colirojo real es un ave estrictamente forestal, ya que cría en bosques maduros, no densos, donde abundan los huecos para nidificar. Las mejores den...

*Phoenicurus phoenicurus* se encuentra ampliamente distribuido por toda Europa hasta el lago Baikal, y más localizado en el sur de Europa, el Magreb y O...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/phoenicurus-phoenicurus.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Tubaria conspersa* (Pers.) Fayod (Basidiomycota)

