



Num. 718. Publicado el 31/12/2018

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Leiobunum defectivum*. Por Izaskun Merino Sainz



Num. 718. Publicado el 31/12/2018

Descripciones de especies

Orthilia secunda (L.) House

Planta con un tallo de 7-25 cm, folioso en su mitad inferior y provisto en la otra mitad de escamas lanceoladas, más o menos persistentes. Hojas de lim...

Bosques húmedos, sobre todo de pinos y abetos, saprófito parcial en el mantillo; 900-2100...

Europa, Asia y N de América. Pirineos....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/orthilia-secunda.html>

Leiobunum defectivum Rambla, 1959

Los leiobúnidos son los opiliones más abundantes y conocidos gracias a las extraordinariamente largas (hasta 72 mm) y delgadas patas engarzadas en un ...

En la Sierra de Guadarrama, Rambla (1959) realiza un estudio en el que halla 75 individuos (49 hembras, 22 machos y 4 juveniles) de *Leiobunum biseriata*...

Leiobunum defectivum es un endemismo ibérico extendido por toda la Meseta del Duero y los relieves circundantes (aunque parece estar ausente en la Cor...

Por MERINO-SÁINZ, Izaskun & CABANILLAS ROLDÁN, David

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/leiobunum-defectivum.html>

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman

Helecho con un rizoma con páleas de color castaño del que surgen frondes de (10)15-35(40) cm; pecíolo 2/3-4/5 de la longitud de la fronde; lámina con ...

Bosques umbrosos y húmedos, con el rizoma bajo el mantillo y en grietas de roquedos o pedregales silíceos; 850-2500 m....

Reino holártico. Sistema pirenaico-cantábrico y sistemas Ibérico y Central, donde es más raro. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/gymnocarpium-dryopteris.html>

Conyza canadensis (L.) Cronquist.

Planta de (3-)50-200(-350) cm, erecta, ramificada generalmente en el extremo. Hojas con las caras normalmente glabras; en los márgenes más o menos cili...



Ruderal y viaria, 0–1100 m....

Naturalizada, oriunda de América del Norte. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/conyza-canadensis.html>

Asarina procumbens Mill.

Hierba perenne, de 7-45(60) cm, con denso indumento formado por pelos glandulíferos pluricelulares, uniseriados, rectos, patentes, de 0,4-0,6 mm. Tall...

Coloniza fisuras de rocas preferentemente silíceas, en media y alta montaña, aunque ocasionalmente desciende a zonas bajas más térmicas; (400)700-2100...

Sierras catalanas prepirenaicas, Pirineos orientales y centrales por ambas vertientes, y Macizo Central francés; al parecer naturalizada en las Islas ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/asarina-procumbens.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Cardamine resedifolia L. (Magnoliophyta)

Galium maritimum L. (Magnoliophyta)

Leiobunum defectivum Rambla, 1959 (Arthropoda)

Paramiopsalis ramulosus Juberthie, 1962 (Arthropoda)

Themisto gaudichaudii Guérin, 1825 (Arthropoda)

Verbascum boerhavii L. (Magnoliophyta)

