



Num. 725. Publicado el 18/02/2019

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Phronima sedentaria*. Por Marcos Fernández Iglesias



Num. 725. Publicado el 18/02/2019

Descripciones de especies

Trogulus nepaeformis (Scopoli, 1763)

Los troglúidos son opiliones característicos del medio edáfico, con patas cortas y cuerpo endurecido, y fuertemente aplanado dorsoventralmente. Presen...

Los troglúidos son opiliones totalmente ligados al suelo, completando todo su ciclo de vida en el medio edáfico. En muestreos realizados en Asturias (...)

Trogulus nepaeformis es una especie europea, distribuida por Centroeuropa y el norte de la península ibérica, donde ocupa una ancha franja por todo el...

Por MERINO-SÁINZ, Izaskun

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/trogulus-nepaeformis.html>

Galium maritimum L.

Hierba perenne, de base lignificada, multicaule, enraizante en los nudos inferiores, fuertemente hirsuta o pelosa, sin aculéolos fuertes, grisácea o b...

Encinares, alcornocales, pinares y matorrales, en substratos pedregosos, márgenes de cultivos en secano, fisuras de muros y roquedos, baldíos, bordes ...

Sur de Francia y E de España. Pirineos, cordillera Costero-Catalana, Sistema Ibérico y Maestrazgo, alcanzando las sierras costeras valencianas...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/galium-maritimum.html>

Cardamine amara L.

Planta herbácea vivaz de sabor picante o amargo, algo suculenta, con un rizoma de 1-1,8 mm de diámetro, muy de ordinario con estolones epigeos o parci...

Sitios húmedos y sombríos, junto a fuentes o arroyos, a veces en pastos húmedos; (35)200-2300 m....

Eurosiberiana. Pirineos centrales y orientales, NE de Cataluña....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cardamine-amara.html>

Camponotus pilicornis (Roger, 1859)

Hormiga cuyas reinas miden unos 16 cm y tienen un color negruzco y amarillento, en tanto que las obreras varían en tamaño de 6 a 14 mm, son polimorf...



Anida en tierra en sitios secos, cálidos, y sus colonias tienen de 500 a 5000 individuos y una sola reina. Presentan actividad crepuscular y se alimentan...

Mediterránea....

Por g

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/camponotus-pilicornis.html>

Amaranthus albus L.

Plantas herbáceas anuales, generalmente erectas y muy ramificadas, de color verde-amarillento o rojizo. Hojas alternas, enteras, pecioladas, con limbo ...

Comunidades nitrófilas, especialmente arvenses de secano y de regadío....

Nativa en América del Norte; naturalizada en Sudamérica, Europa, África del Norte y gran parte de Asia. Toda la Península, salvo algunas zonas del N y...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/amaranthus-albus.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Camponotus pilicornis (Roger, 1859) (Arthropoda)

Cocos nucifera L. (Magnoliophyta)

