



## Num. 728. Publicado el 11/03/2019

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Cyanopica cooki*. Por César Fernández González



**Num. 728. Publicado el 11/03/2019**

## Descripciones de especies

### *Onopordum illyricum subsp. illyricum* L.

Planta herbácea bienal, por lo general multicaule, espinosa, verde-grisácea, blanquecina o blanco-grisácea, rara vez verde, con indumento denso de pel...

Bordes de camino, laderas pedregosas, claros de matorral xerófilo, por lo general en sustratos calizos o yesos, nitrófila; (0)500-1300 m....

Sur de Europa occidental; naturalizada en Australia. Dispersa por el N de Portugal, C, CW, E y S de España y Baleares. ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/onopordum-illyricum-subsp-illyricum.html>

### *Lobaria pulmonaria* (L.) Hoffm.

Liquen folioso de talo muy grande, llegando a sobrepasar los 35 cm de diámetro, con una parte más o menos adherida al sustrato y otras en franjas bien...

En territorios con precipitaciones abundantes y en enclaves poco heliófitos; epifitas en troncos y ramas de árboles y arbustos o sobre rocas musgosas,...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lobaria-pulmonaria.html>

### *Festuca elegans* Boiss.

Planta herbácea cespitosa de 50-90 cm, con renuevos intravaginales, vernación conducida. Hojas de los renuevos plegadas; vaina abierta, escabriúscul...

Pastos vivaces (lastonares), fisuras de roquedos, en sustratos silíceos (esquistos) y calizos descarbonatados (calizas, dolomías), 900-1800 m....

Íbero-magrebí...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/festuca-elegans.html>

### *Cyanopica cooki* Bonaparte, 1850

El rabilarco es un ave de 34-35 cm de longitud y 38-40 cm de envergadura, con una silueta muy parecida a una urraca (*Pica pica*). Presenta una cola lar...

*Cyanopica cooki* vive principalmente en masas forestales no muy densas, precisando siempre de áreas de suelo libre de matorral en donde poder alimentar...

La distribución mundial de este córvido es curiosa, ya que presenta dos poblaciones separadas por millares de kilómetros. Una de ellas -la más



extensa...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cyanopica-cooki.html>

## *Amsinckia calycina* (Moris) Chater

Planta herbácea de hasta de 60 cm, setoso-hispida, unicaule. Tallos erectos, ramificados en la parte superior, hispídos, con pelos patentes de distint...

Ruderal y arvense; 650-1500 m....

De origen sudamericano, se encuentra naturalizada en el SO de Europa -Francia y España- y en Australia. C de España....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/amsinckia-calycina.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Festuca elegans* Boiss. (Magnoliophyta)

*Halimium calycinum* (L.) K. Koch (Magnoliophyta)

*Onopordum illyricum subsp. illyricum* L. (Magnoliophyta)

*Porphyrio porphyrio* (Linnaeus, 1758) (Chordata)

ISSN 1887-5068

