



## Num. 729. Publicado el 18/03/2019

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Viola riviniana*. Por Ignacio Fernández Villar



**Num. 729. Publicado el 18/03/2019**

## Descripciones de especies

### *Paronychia argentea* Lam.

Hierba perenne, algo leñosa en la base, ocasionalmente bienal. Tallos 3-50 cm, postrados, muy ramificados desde la base; entrenudos de hasta 3,5 cm, r...

Pastos en suelos arenosos o pedregosos, secos, márgenes de caminos, terrenos baldíos, etc., en medios más o menos ruderalizados; 0-1950 m....

Región mediterránea, Canarias. Dispersa por toda la Península Ibérica y Baleares, falta en la zona cantábrica....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/paronychia-argentea.html>

### *Lamarckia aurea* (L.) Moench.

Planta herbácea cespitosa de 4-35 cm. Hojas con una lámina de hasta 11 cm x 3-9 mm, plana, con nervio central prominente; lígula hasta 10 mm; vaina de ...

Pastizales terofíticos, en lugares nitrificados, 0-2000 m....

Mediterránea y macaronésica, alcanzando Asia occidental y central....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lamarckia-aurea.html>

### *Halimium calycinum* (L.) K. Koch

Sufrutice de hasta 60 cm de altura, muy ramoso, erecto o algo procumbente. Tallos con unas ramitas divaricadas y gráciles, otras cortas, tortuosas; ra...

Matorrales y subvuelo de pinares, en suelo seco y arenoso, muy suelto, con preferencia en las dunas fijadas sublitorales; 0-650 m. Península Ibérica ...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/halimium-calycinum.html>

### *Cyperus capitatus* Vand.

Planta herbácea, perenne; con rizomas que pueden alcanzar un tamaño de metros, subleñosos, con abundantes escamas pardas en las yemas. Tallos hasta de...

Frecuente en playas y arenales costeros con arenas móviles; 0-30 m....

Litoral mediterráneo y subatlántico occidental. Toda la costa de la Península, excepto en el N, y Baleares....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cyperus-capitatus.html>



*Chamaesyce canescens* subsp. *canescens* (L.) Prokh.

Planta anual, procumbente, pelosas, más raramente glabrescentes o glabras. Tallos de hasta 30 cm, ramificados radialmente desde la base hasta en 25 ra...

Comunidades nitrófilas y ruderales de biótopos pisoteados, siempre sobre suelos húmedos más o menos compactos; 0-1000 m....

Región mediterránea y SO de Asia, introducida en Sudamérica. Dispersa por gran parte de la Península Ibérica -escasea o falta en el cuadrante NO- y Ba...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/chamaesyce-canescens-subsp-canescens.html>

## Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

*Cicada orni* Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

