



Num. 731. Publicado el 01/04/2019

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Lysimachia nemorum*. Por Ignacio Fernández Villar



Num. 731. Publicado el 01/04/2019

Descripciones de especies

Ramalina farinacea (L.) Ach.

Liquen con talo fruticoso de 3-10 cm de largo, más o menos colgante, más o menos pulvinar. Las lacinias surgen de un hapterio bien delimitado, a vec...

Sobre una gran variedad de sustratos y hábitats muy diferentes, tanto sobre cortezas como sobre madera en descomposición y rocas silíceas o muros, sie...

Holártica, especialmente común en zonas templadas costeras....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ramalina-farinacea.html>

Grus grus (Linnaeus, 1758)

La grulla común es un ave grande y esbelta, con una longitud de 96-119 cm y una envergadura de 180-222 cm. Sus patas y cuello son largos y de coloraci...

Durante la época de cría, ocupa básicamente terrenos pantanosos y otros humedales, con vegetación palustre o herbácea. En invierno, las bandadas de gr...

Las áreas de reproducción de la grulla común se extienden por una amplia franja que abarca el norte de Europa y el centro y noreste de Asia, con algun...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/grus-grus.html>

Coronilla scorpioides (L.) W.D.J. Koch

Hierba anual, glabra, glauca, con tallos de 5-55 cm, cilíndricos, sin costillas diferenciadas, ramificados desde la base, el central erecto, los later...

Campos incultos, bordes de cultivos y caminos, pastizales y matorrales, preferentemente en sustrato calcáreo; 0-1600 m....

Región mediterránea y Macaronesia. Casi toda la Península Ibérica y Baleares....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/coronilla-scorpioides.html>

Arabis alpina L.

Planta de hasta 40 cm, rizomatosa, con un indumento denso, formado principalmente por pelos bífidos, trífidos y cuadrífidos. Tallos generalmente ascen...

Prados húmedos y sombríos, fisuras de rocas, etc., en sustratos básicos; 600-2800 m....



Eurasia, N y CE de África, Macaronesia, N de América (Canadá). Mitad N de la Península Ibérica, especialmente en el sistema pirenaico-cantábrico, y si...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/arabis-alpina.html>

Ammotragus lervia Pallas, 1777

El arruí, arrui o carnero de berbería es un bóvido con una morfología de carácter intermedio entre los géneros Capra y Ovis. Los machos son algo más g...

Se distribuye de forma natural por prácticamente cualquier zona rocosa escarpada y montañosa de las regiones desérticas y semidesérticas, desde el niv...

Su área de distribución natural son las zonas escarpadas y montañosas de las regiones desérticas y semidesérticas norteafricanas (Argelia, Chad, Egip...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ammotragus-lervia.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Ammotragus lervia Pallas, 1777 (Chordata)

Lathyrus clymenum L. (Magnoliophyta)

Ramalina farinacea (L.) Ach. (Ascomycota)

Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale (Ascomycota)

