



## **Num. 737. Publicado el 13/05/2019**

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Testudo graeca*. Por José Rafael González López



**Num. 737. Publicado el 13/05/2019**

## Descripciones de especies

### *Nymphaea alba* L.

Planta herbácea acuática perenne con un rizoma grueso, negro, horizontal. Hojas fasciculadas sobre el rizoma, con estípulas lanceoladas y libres; las i...

Aguas dulces estancadas o de corriente lenta....

Europa y Asia. La mayor parte de la Península y Baleares....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/nymphaea-alba.html>

### *Nuphar luteum subsp. luteum* (L.) Sm.

Planta herbácea acuática. Hojas sumergidas sésiles o brevemente pecioladas, ondulado-crispadas; las flotantes con pecíolo dilatado y membranoso hacia l...

Aguas estancadas o de corriente lenta....

Europa y oeste de Asia. Dispersa por gran parte de la Península....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/nuphar-luteum-subsp-luteum.html>

### *Lotus cytisoides* L.

Hierba perenne, seríceo o subglabra, con tallos hasta de 30 cm, decumbentes o ascendentes, ramificados. Hojas con 5 folíolos, los inferiores de cada ho...

Pastizales y matorrales de roquedos calizos litorales, y arenales marítimos; 0-50 m....

Sur de Europa, SO de Asia y N de África. Islas Baleares y litoral del S y del E de España....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lotus-cytisoides.html>

### *Launaea cervicornis* (Boiss.) Font Quer & Rothm.

Planta sufruticosa de 6-20(30) cm, espinoso, en general glabro, hemisférico, almohadillado, de ramificación densa, con numerosos tallos basales. Tallo...

Zonas litorales rocosas, en substrato calizo o esquistoso; 5-30 m....

Endemismo de las Islas Baleares....



Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/launaea-cervicornis.html>

## *Cerura erminea* (Esper, 1783)

Mariposa de 30-38 mm de longitud las hembras y 25-30 mm los machos, de color blanco con manchas negras en el tórax y patas y en las alas una especie d...

*Cerura erminea* habita en bosques de ribera, otros bosques ricos en álamos y también en avenidas de álamos o arboledas de álamos. Generalmente es muy l...

*Cerura erminea* se encuentra localmente desde el norte de España a través de Europa y Asia hasta Kamchatka. En Europa, *Cerura erminea* está ausente en e...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cerura-erminea.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Aphis farinosa* Gmelin, 1790 (Arthropoda)

*Asphodelus aestivus* Brot. (Magnoliophyta)

*Asphodelus ramosus subsp. ramosus* L. (Magnoliophyta)

*Launaea cervicornis* (Boiss.) Font Quer & Rothm. (Magnoliophyta)

*Lepus granatensis* Rosenhauer, 1856 (Chordata)

*Limoniastrum monopetalum* (L.) Boiss. (Magnoliophyta)

*Lotus cytisoides* L. (Magnoliophyta)

*Palinurus mauritanicus* (Gruvel, 1911) (Arthropoda)

*Picromerus bidens* (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

*Scrophularia canina subsp. canina* L. (Magnoliophyta)

*Scrophularia canina subsp. ramosissima* (Loisel.) P. Fourn. (Magnoliophyta)

*Spinolambrus macrochelos* (Herbst, 1790) (Arthropoda)



*Testudo graeca* Linnaeus, 1758 (Chordata)

