



Num. 74. Publicado el 08/05/2006

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Scutellinia trechispora*. Por Enrique Rubio Domínguez



Num. 74. Publicado el 08/05/2006

Descripciones de especies

Trapania hispalensis Cervera y Gracia-Gómez, 1989

Nudibranquio de cuerpo limaciforme, relativamente grueso y que alcanza el centímetro de longitud. Sobre el cuerpo, además de las branquias y los rinóf...

Vive en fondos rocosos, sobre esponjas pertenecientes al género *Ircinia*, aunque realmente se alimenta de pequeños animales que crecen sobre esponjas l...

Al menos desde el sur del Atlántico francés al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/trapania-hispalensis.html>

Pagellus acarne (Risso, 1827)

Pez de cuerpo alto y fusiforme, no tan comprimido lateralmente como otras especies del género y que alcanza los 36 cm de longitud. La cabeza tiene los...

Los adultos viven en varios tipos de fondos, especialmente en aquellos con poblaciones de algas y de arena hasta los 500 m de profundidad, pero es más...

Desde el Mediterráneo a Senegal y el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pagellus-acarne.html>

Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758)

Pez de cuerpo alargado que llega a medir los 40 cm, aunque en ocasiones alcanza los 70. La cabeza es alargada y puntiaguda, y sus mandíbulas son desig...

Se suele encontrar más frecuentemente entre 30 y 100 m de profundidad, en fondos de fango o grava pero también en los de arena y roca y es capaz de en...

Desde el Mar de Barents e Islandia a Portugal, y también presente en el Mar Negro, Egeo y Adriático; es raro en el NO del Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/merlangius-merlangus.html>

Megatrema anglicum (Soweby, 1823)



Balano de concha cónica y base circular que puede alcanzar los 6 mm de diámetro. Es de color rosa y en el exterior no tiene estructuras marcadas pero ...

Vive asociado al coral *Caryophyllia smithi*, aunque ocasionalmente se encuentra sobre otras especies como *Dendrophyllia* y *Ballanophyllia*...

Desde las Islas Británicas al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/megatrema-anglicum.html>

Linum bienne Miller

Planta herbácea bianual que alcanza los 70 cm de altura. Las hojas son sésiles, alternas, glabras, sin glándulas basales, estrechas, lanceoladas, de 2...

Especie bastante frecuente en prados de siega, bordes de caminos, roquedos nitrificados desde el nivel del mar hasta los 1000 m de altura....

Suroeste de Europa, desde las Islas Británicas al Mediterráneo y también en Madeira y Canarias....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/linum-bienne.html>

Lacuna pallidula (da Costa, 1778)

Concha de forma globular, lisa, con 3 o 4 vueltas de espira que se expanden rápidamente, siendo las suturas entre ellas bastante profundas; la última ...

En aguas poco profundas, generalmente sobre algas, hasta los 70 m de profundidad. En la época reproductora viven cerca de la superficie y ponen los hu...

Costa atlántica europea desde las Islas Británicas al sur....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lacuna-pallidula.html>

Funiculina quadrangularis (Pallas, 1766)

Antozoo pennatuláceo de bastante longitud, que alcanza los 2 m. Al pertenecer al grupo de las plumas de mar, secundariamente se produce el desarrollo ...

Vive en sustratos fangosos, con la parte basal enterrada en el mismo, desde los 20 m hasta aguas profundas, pero generalmente desde los 150 - 200 m ha...

Atlántico norte, aunque posiblemente sea cosmopolita....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/funiculina-quadrangularis.html>



Brissopsis lyrifera (Forbes, 1841)

Erizo acorazonado que mide entre 40 y 70 mm de longitud y de color rojo pardusco. El caparazón es más largo que ancho, bastante frágil. La fasciola de...

Enterrado en sustratos fangosos o con cierto contenido de arena entre los 5 y casi 400 m de profundidad. Es el único erizo acorazonado que vive en sus...

Desde el Mar del Norte al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/brissopsis-lyrifera.html>

Anthyllis vulneraria subsp. iberica (W. Becker) Jalas ex

Planta perenne, con tallos de 10 a 30 cm, ascendentes o decumbentes, de consistencia herbácea, seríceos, rara vez glabrescentes en la base y ramosos e...

Vive en arenales y acantilados costeros, hasta los 300 m de altura. ...

En las zonas costeras de Europa occidental, desde el litoral N y NO de la Península hasta el Canal de la Mancha. Las plantas presentes en el litoral v...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/anthyllis-vulneraria-subsp-iberica.html>

Acanthochitona fascicularis (Linnaeus, 1767)

Quitón de hasta 60 mm de longitud, de forma oval alargado, el doble de largo que ancho. Su color es variable, blanquecino con tonos blanquecinos, amar...

Vive en aguas poco profundas, por lo normal bajo piedras....

Desde las Islas Británicas al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/acanthochitona-fascicularis.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Aquilegia vulgaris subsp. vulgaris L. (Magnoliophyta)

Carex divulsa Stokes (Magnoliophyta)



Leucosolenia variabilis (Porifera)

Malva sylvestris L. (Magnoliophyta)

Schoenus nigricans L. (Magnoliophyta)

Scorzonera humilis L. (Magnoliophyta)

Tamus communis L. (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008