



Num. 742. Publicado el 17/06/2019

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Streptopus amplexifolius*. Por Juan Luis Menéndez



Num. 742. Publicado el 17/06/2019

Descripciones de especies

Phelipanche rosmarina (Beck) Banfi, Galasso & Soldano

Planta anual o perenne con un tallo de 12-15 x 0,5-0,7 cm, notablemente grueso en proporción a su altura, generalmente simple, con pelos glandulíferos...

Parásita de *Rosmarinus officinalis*; 50-650? m....

Región Mediterránea....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/phelipanche-rosmarina.html>

Lycosa hispanica (Walckenaer, 1837)

Lycosa hispanica es una de las arañas de mayor tamaño de la Península ibérica, ya que los machos alcanzan una longitud corporal de 19 a 25 mm y las he...

Lycosa hispanica es una araña propia de las llanuras esteparias, en ambientes soleados con poco recubrimiento vegetal, con matorral bajo. Las hembras...

Endemismo ibérico...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lycosa-hispanica.html>

Ferula communis subsp. catalaunica (Pau ex C. Vicioso) Sánchez Cuxart & Bernal

Hierba perenne con tallos de (100)160-250(330) cm, erectos, débilmente estriados, cuya relación entre la longitud de la caña y la de la inflorescencia...

Matorrales y herbazales, lugares alterados -baldíos, cunetas-, a veces cultivada, en suelos pedregosos o rocosos, en conglomerados, calizas, margas o ...

En casi toda la Península Ibérica y Baleares, pero es rara o falta en las provincias atlánticas....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ferula-communis-subsp-catalaunica.html>

Ephedra fragilis subsp. fragilis Desf.

Arbusto de hasta 3(4) m, erecto o ascendente, muy denso. Ramas viejas cenicientas; ramillas 1,5-2,2 mm de diámetro, muy fácilmente desarticulables, al...



Lugares áridos, generalmente calcáreos o yesosos, arenales salinos, en matorrales esclerófilos; 0-1100 m....

Oeste de la región mediterránea y Macaronesia. Mitad S y E de España, SW de Portugal....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/ephedra-fragilis-subsp-fragilis.html>

Astragalus balearicus Chater

Sufrútice hasta de 15(25) cm de altura y 30 cm de diámetro, espinoso, almohadillado, con pelos adpresos, mediifijos, con los brazos simétricos. Tallos...

Matorrales y roquedos calcáreos; 0-1350 m....

Astragalus balearicus es endémico de Mallorca -Sierras de la Tramuntana, Artá y Randa-, N de Menorca y Cabrera....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/astragalus-balearicus.html>

Novedades corológicas

Hoploplana villosa (Lang, 1884) (Platyhelminthes)

Primera cita para Galicia - Citado por Marcos Fernández Iglesias en HIO (RESTO PARROQUIA), Playa de Temperán, Cangas. PONTEVEDRA el día 11/06/2019

Más información en <http://www.asturnatura.com/fotografia/fauna-invertebrados/hoploplana-villosa-1/33375.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Armeria pungens (Link) Hoffmanns. & Link (Magnoliophyta)

Hoploplana villosa (Lang, 1884) (Platyhelminthes)

Kundmannia sicula (L.) DC. (Magnoliophyta)

Menemerus semilimbatus (Hahn, 1829) (Arthropoda)

Nustera distigma (Charpentier, 1825) (Arthropoda)

Orobanche crenata Forssk. (Magnoliophyta)

Podarcis virescens Geniez, Sá-Sousa, Guillaume, Cluchier y Crochet, 2014 (Chordata)



Rhingia rostrata Linnaeus, 1758 (Arthropoda)

Teucrium subspinosum Pourr. ex Willd. (Magnoliophyta)

