



Num. 743. Publicado el 24/06/2019

La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.

Fotografía: *Pteronemobius heydenii*. Por José Rafael González López



Num. 743. Publicado el 24/06/2019

Descripciones de especies

Solanum linnaeanum Hepper & P.-M.L. Jaeger

Sufrútice espinoso, estrellado-pubescente, con tallos de 50-200 cm, erectos, profusamente ramificados, fuertes, provistos de espinas hasta de 15 mm, d...

Ambientes ruderales costeros y cálidos, cunetas, eriales, áreas periurbanas, playas, etc.; 0-200 m. I-XII. Originaria de África austral...

Actualmente naturalizada en el S de Europa, N de África, Hawái, Nueva Zelanda, Australia y América del Norte. Comarcas litorales mediterráneas y atlán...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/solanum-linnaeanum.html>

Pteronemobius heydenii (Fischer, 1853)

Los ejemplares de *Pteronemobius heydenii* tienen una longitud de 5 a 7 mm, y una coloración marrón oscura a casi negra. La cabeza tiene sedas negras esp...

Es un grillo típico de hábitat húmedo (zonas ribereñas de lagos, pantanos, ríos, y prados húmedos) y con cierta temperatura. En verano se pueden encon...

En lo concerniente a su distribución, en Europa se extiende desde España a través de Francia, Italia, el sur de Alemania y Europa del Este hasta el Ma...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pteronemobius-heydenii.html>

Orobanche crenata Forsk.

Hierba perenne, erecta, ramificada, con tallos de 30-100 cm, finamente acostillados, glabros. Hojas basales de 10-30 x 5-12 cm, 1-2 pinnatisectas, de c...

Márgenes de cultivos y de caminos, de ordinario en lugares secos, en suelos calizos o dolomíticos; 0-400 m....

S y SW de Europa (Creta, S de Grecia, Italia, Francia, Península Ibérica, Baleares), y NW de África. E y S de la Península, y Baleares, principalment...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/orobanche-crenata.html>

Nustera distigma (Charpentier, 1825)

Cerambícido florícola con un tamaño de 9 a 15 mm. La cabeza, antenas y torax de color negro; los élitros rojos con una mancha circular en el



centro, q...

Su ciclo vital abarca de dos a tres años, alimentándose los imagos de umbelíferas y cistáceas, y desarrollándose sus larvas en la madera de Quercus y ...

Se distribuye por el mediterráneo desde el norte de África hasta la parte meridional de la península ibérica y Francia...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/nustera-distigma.html>

Cistus monspeliensis L.

Arbusto de 60-120(180) cm, erecto, ramoso, compacto, muy viscoso, oloroso, con ramillas hirsutas, con pelos patentes no muy densos. Hojas de 15-45(70) ...

Matorrales densos que corresponden a la etapa regresiva de los encinares, alcornoques y quejigales en clima mediterráneo cálido, con otoños lluviosos...

Región mediterránea, Madeira y Tenerife. En la Península Ibérica, mitad S y en todo el litoral mediterráneo y las Baleares....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cistus-monspeliensis.html>

Nuevas especies incluidas en asturnatura.com

Cetonia carthami Gory & Percheron (Arthropoda)

Chrysotoxum intermedium (Meigen, 1822) (Arthropoda)

Crambus pratella (Linnaeus, 1758) (Arthropoda)

Galium parisiense subsp. divaricatum (Pourr. ex Lam.) Rouy & E.G. Camus (Magnoliophyta)

Larus audouinii Payraudeau, 1826 (Chordata)

Medicago praecox DC. (Magnoliophyta)

Peltigera membranacea (Ach.) Nyl. (Ascomycota)

Prasium majus L. (Magnoliophyta)

