



## Num. 746. Publicado el 15/07/2019

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Podarcis carbonelli*. Por José Rafael González López



**Num. 746. Publicado el 15/07/2019**

## Descripciones de especies

### *Scrophularia peregrina* L.

Hierba anual, glabra o glabrescente, con tallos hasta de 75(105) cm, simples o ramificados, glabros o con pelos glandulíferos hasta de 0,2(0,3) mm. Hoj...

Herbazales sombríos y húmedos de huertas y bordes de caminos, a veces al pie de roquedos más o menos nitrificados; 0-550 m....

Región mediterránea (excepto Marruecos, Argelia, Egipto y Palestina) y SW de Asia (Crimea y Cáucaso); introducida en Gran Bretaña. Islas Baleares, E y...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/scrophularia-peregrina.html>

### *Podarcis carbonelli* Perez-Mellado 1981

Especie endémica de la Península Ibérica, anteriormente era considerada subespecie de *Podarcis bocagei*, pero estudios de ADN nuclear la han elevado a ...

Vive en el suelo y está adaptada a ambientes moderadamente húmedos y frescos. En las zonas de clima atlántico puede ocupar una variedad de medios rela...

Su área de ocupación es menor de 5.000 km<sup>2</sup> y su distribución está muy fragmentada, disminuyendo continuamente la extensión de su presencia y el número...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/podarcis-carbonelli.html>

### *Opopanax chironium* W.D.J. Koch

Hierba perenne con raíz carnosa, gruesa, ramificada en profundidad, que suelta un látex blanco -el cual se torna amarillo limón- al cortarla, como el ...

Sotos, orlas o herbazales, en suelos ricos en nitrógeno, pedregosos o húmedos, de preferencia calizos y en lugares sombríos; 0-1200(1500) m....

Región mediterránea europea, desde Rumanía, Turquía y la Península Balcánica hasta España, más Sicilia y Cerdeña. NE, C y S de la Península Ibérica -e...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/opopanax-chironium.html>

### *Macrosiagon tricuspdatum* (Lepechin, 1774)

Rhipiphorido de coloración general naranja-rojizo; punta de las antenas, ojos, scutellum, meso y metatórax; negros; élitros de color anaranjado,



gene...

Viven en zonas muy soleadas. Los imagos se localizan a finales de primavera y durante el verano en inflorescencias de umbelíferas (principalmente Eryng...

Se distribuye por Europa Central y Meridional, llegando por el este hasta Siberia y el Cáucaso; en África se ha citado en Egipto....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/macrosiagon-tricuspidatum.html>

## *Dorycnium fulgurans* (Porta) Lassen

Arbusto almohadillado, hasta de 100 cm de altura y 100 cm de diámetro, espinoso. Tallos ascendentes, más o menos zigzagantes, estriados, terminados ...

Matorrales costeros, en substrato calcáreo o arenoso; 0-100 m....

Especie endémica de las Islas Baleares....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/dorycnium-fulgurans.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Aphis oenotherae* Oestlund, 1887 (Arthropoda)

*Blackstonia acuminata* (W.D.J. Koch & Ziz) Domin (Magnoliophyta)

*Hyoseris radiata* L. (Magnoliophyta)

*Hypericum australe* Ten. (Magnoliophyta)

*Lecanora rupicola* (L.) Zahlbr. (Ascomycota)

*Paratettix meridionalis* (Rambur, 1838) (Arthropoda)

*Phlomis italica* L. (Magnoliophyta)

*Phyllognathus excavatus* (Forster, 1771) (Arthropoda)

*Podarcis carbonelli* Perez-Mellado 1981 (Chordata)



*Urospermum picroides* (L.) Scop. (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008