



## Num. 747. Publicado el 22/07/2019

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: *Gyas titanus*. Por Iñaki Rojo Legarra



**Num. 747. Publicado el 22/07/2019**

## Descripciones de especies

### *Phyllognathus excavatus* (Forster, 1771)

Escarabeido con un tamaño de 15 a 25 mm, con el cuerpo de coloración marrón rojiza, la cabeza algo más oscura; antenas flaveliformes, de coloración fe...

Los machos compiten por las hembras con sus cuernos y, una vez fecundadas, las hembras depositan los huevos en troncos podridos, eclosionando a las do...

Habita en la Europa mediterránea, el occidente de Asia (hasta Irán y Transcaspia), el norte de África, Senegal y Canarias. ...

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/phylognathus-excavatus.html>

### *Lavatera olbia* L.

Arbusto o subarbusto con un tallo de 0,6-2,5(3) m, generalmente muy ramificado, más o menos purpúreo; indumento formado por pelos estrellados muy pequ...

Márgenes de pequeños ríos, lugares húmedos, setos de márgenes de caminos, sobre suelos calcáreos, arcilloso-calcáreos o arenosos; 0-750 m....

Región mediterránea occidental y S y SW de Portugal. Cultivada en jardines; naturalizada en Inglaterra...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/lavatera-olbia.html>

### *Hydrocotyle bonariensis* Lam.

Planta herbácea glabra con tallos prostrados, radicales en los nudos, con entrenudos de (0,5)1-12 cm. Hojas de 2-8,5 x (1,5)2-7 cm, peltadas, de suborb...

Dunas y arenales costeros, en zonas en contacto con agua dulce; 0-25 m. ...

Zonas templadas del continente americano, desde el S de los Estados Unidos hasta el N de Chile y Argentina; introducida en España, Francia, Italia y P...

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/hydrocotyle-bonariensis.html>

### *Asteriscus aquaticus* (L.) Less.

Planta anual, seríceo-tomentosa, con tallos de hasta 50 cm, erectos, simples o ramificados en la parte superior, con ramas laterales generalmente sobr...



Cunetas campos incultos y herbazales....

Regiones Maditerránea y Macaronésica (Madera, Canarias)....

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/asteriscus-aquaticus.html>

*Aphis oenotherae* Oestlund, 1887

Hembras ápteras adultas tienen una longitud de 1,5 a 2 mm, son de color verde pálido amarillento a verde oscuro, y están ligeramente recubiertas de po...

Vive sobre *Oenother* y se puede encontrar en playas, dunas costeras y zonas ruderales....

*Aphis oenotherae* es una especie de pulgón estadounidense que se introdujo en Europa a finales del siglo XX....

Por GONZÁLEZ LÓPEZ, José Rafael

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/aphis-oenotherae.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Disphyma crassifolium* (L.) L. Bolus (Magnoliophyta)

