



## Num. 75. Publicado el 15/05/2006

*La revista online asturnatura.com es publicada y editada por la web <http://www.asturnatura.com>. Es una publicación online que nace con el objeto de dar a conocer la naturaleza de la Región Cantábrica (desde los Pirineos Atlánticos al norte de Portugal), tratando de difundir su flora, fauna y geología, a todas las personas interesadas en la misma, si bien además contempla información del resto de la Península Ibérica.*

Fotografía: . Por César Fernández González



**Num. 75. Publicado el 15/05/2006**

## Descripciones de especies

### *Trifolium pratense* L.

Hierba perenne con tallos que miden entre 6 y 110 cm. Éstos son glabros, glabrescentes o con pelos adpresos o patentes, de hasta 1 mm de longitud. Las...

Vive en prados de siega, aunque también aparece en los de diente, cultivos abandonados y bordes de caminos, en suelos generalmente frescos, arcillosos...

Desde Noruega hasta España y el oeste de Asia....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/trifolium-pratense.html>

### *Scomberesox saurus subsp. saurus* (Walbaum, 1792)

Pez de cuerpo alargado y comprimido que alcanza los 50 cm de longitud. Las mandíbulas, provistas de pequeños dientes, son también alargadas y la infer...

Es una especie oceánica gregaria que puede formar grandes bancos y que en ocasiones se acerca a la costa. Se alimenta de zooplancton y larvas de peces...

Desde Noruega, Islandia y Dinamarca hasta Marruecos y el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/scomberesox-saurus-subsp-saurus.html>

### *Rissoa guerinii* Récluz, 1843

Molusco gasterópodo de concha ovalada a cónica, sólida, con 8 vueltas de espira que alcanza los 5 mm de altura y los 2 de anchura. Las últimas 4 o 5 v...

En aguas poco profundas, sobre algas o bajo piedras....

Desde las Islas Británicas a Canarias y el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/rissoa-guerinii.html>

### *Paralcyonium spinulosum* (Delle Chiaje, 1822)

Coral alcionario, octocoralario formador de colonias gruesas y carnosas, de entre 3 y 10 cm de altura, con un esqueleto axial interno formado por



espí...

Vive en hendiduras de rocas en fondos fangosos o con detritos....

Común en el Mediterráneo. En las costas atlánticas aparece de forma aislada y muy rara hasta la Bretaña francesa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/paralecyonium-spinulosum.html>

## *Pancratium maritimum* L.

Planta perenne, provista de un bulbo bastante enterrado, de 5 - 7 x 4 - 5 cm con un cuello bastante largo y túnicas membranosas pálidas. El escapo fl...

Crece en las dunas costeras, desde el nivel del mar a los 50 m de altitud....

Aparece en las costa atlántica de Norteamérica, S de Europa -desde la desembocadura del Loira, en Francia, hasta las costas de Bulgaria-, N de África...

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/pancratium-maritimum.html>

## *Neptunea antiqua* (Linnaeus, 1758)

Gasterópodo con concha de unos 100 x 50 mm, a veces más larga, con 7 vueltas de espira. La protoconcha es bulbosa y la última vuelta de espira ocupa u...

Sublitoral, encontrándose desde los 15 a los 1200 m, generalmente en sustratos blandos....

Desde el Cantábrico al ártico....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/neptunea-antiqua.html>

## *Luidia ciliaris* (Philippi, 1837)

Es una estrella de gran tamaño, que alcanza los 40 - 75 cm de diámetro. El cuerpo y los brazos, de textura aterciopelada, son de color rojizo, pardo a...

En sustratos de arena, grava o mixtos hasta los 400 m de profundidad, en los que puede enterrarse parcialmente. Se alimenta de otros equinodermos, com...

Desde las Islas Feroes a Cabo Verde y el Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/luidia-ciliaris.html>



## *Liza aurata* (Risso, 1810)

Pez de cuerpo alargado y fusiforme, de hasta 50 cm de longitud, cilíndrico, con grandes escamas que cubren todo el cuerpo. La cabeza relativamente anc...

Se trata de una especie nerítica que entra en lagunas y estuarios. Se alimenta de pequeños organismos bentónicos y ocasionalmente insectos y plancton....

Desde Escocia a Cabo Verde, Mediterráneo y Mar Negro....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/liza-aurata.html>

## *Didemnum maculosum* (Milne-Edwards, 1841)

Ascidia que forma colonias de textura lisa o rugosa, duras, de color variable, que puede ser blanco, grisáceo o blanquecino con parches violáceo; suel...

Crece sobre rocas u otros organismos, especialmente algas, como Laminaria, Cystoseira y Delesseria, en aguas poco profundas....

Desde el Mar del Norte y las Islas Británias al Mediterráneo....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/didemnum-maculosum.html>

## *Cynosurus cristatus* L.

Planta perenne, con tallos de entre 15 y 80 cm de altura, de consistencia bastante fuerte. Las hojas miden 0.5 - 2 mm de ancho y tienen una vaina lisa...

Vive en prados de siega, setos y orlas de bosques, desde el nivel del mar a los 1700 m. ...

Presente en la mayor parte de Europa....

Por asturnatura.com

Disponible en <http://www.asturnatura.com/especie/cynosurus-cristatus.html>

## **Nuevas especies incluidas en asturnatura.com**

*Codium bursa* (Olivi) C.Agardh, 1817 (Chlorophyta)

*Cymbalaria muralis* P. Gaertn., B. Mey. & Scherb. (Magnoliophyta)



*Euphorbia amygdaloides* L. (Magnoliophyta)

*Fumaria capreolata* L. (Magnoliophyta)

*Hordeum murinum* L. (Magnoliophyta)

*Iberis procumbens* (Magnoliophyta)

*Limosa limosa* (Linnaeus, 1758) (Chordata)

*Ononis reclinata* L. (Magnoliophyta)

*Reseda media* Lag. (Magnoliophyta)

*Senecio pyrenaicus* L. (Magnoliophyta)

*Silene nutans* L. (Magnoliophyta)

ISSN 1887-5068



9 771887 506008